

主要活断層帯の長期評価の概要(算定基準日 令和7年(2025年)1月1日) <都道府県別>

(陸域・沿岸域の活断層から発生する地震の今後30, 50, 100年以内の地震発生確率等)

■ : 経年等により値が変わったもの

- ・都道府県の記載順は都道府県JISコード(JIS X0401)に基づいています。
- ・各都道府県に位置する主要活断層帯を、都道府県別に掲載しています。
- ・複数の都道府県に位置している主要活断層帯については、位置している全ての都道府県の欄に掲載しています。再掲した主要活断層帯名を薄緑色で示しています。
- ・主要活断層帯単位で掲載しているため、主要活断層帯が複数の活動区間に分かれている場合は、各都道府県に位置していない活動区間も掲載している場合があります。

■北海道地方

都道府県	断層帯名 (起震断層/活動区間)	よみかた	長期評価で 予想した 地震規模 (マグニチュード)	我が国の主な 活断層における 相対的評価 (注4)		地震発生確率 (注1)			地震後 経過率 (注2)	平均活動間隔	
				ランク	色	30年以内	50年以内	100年以内		最新活動時期	
北海道	標津断層帯	しべつ だんそうたい	7.7程度以上	Xランク		不明(注3)	不明(注3)	不明(注3)	不明(注3)	不明	
	十勝平野断層帯 (主部)(注5)	とかちへいや だんそうたい	8.0程度	Aランク		0.1%~0.2%	0.2%~0.3%	0.5%~0.6%	不明	17,000-22,000年程度	
	十勝平野断層帯 (光地園断層)(注6)		7.2程度	Aランク		0.1%~0.4%	0.2%~0.7%	0.5%~1%	—	7,000-21,000年程度 約21,000年前以後に2回	
	富良野断層帯 (西部)	ふらの だんそうたい	7.2程度	Zランク		ほぼ0%~ 0.03%	ほぼ0%~ 0.06%	ほぼ0%~0.1%	0.07-0.5	4,000年程度 2世紀以後、1739年以前	
	富良野断層帯 (東部)		7.2程度	Zランク		ほぼ0%~ 0.01%	ほぼ0%~ 0.02%	ほぼ0%~ 0.05%	0.1-0.5	9,000-22,000年程度 約4,300年前以後、約2,400年前以前	
	増毛山地東縁断層帯・沼田-砂川付近の断層帯 (増毛山地東縁断層帯)(注5)	ましけさんちと うえんだんそう たい・ぬまたー すながわふさ きのだんそうた い	7.8程度	Aランク		0.6%以下	1%以下	2%以下	不明	5,000年程度以上	
	増毛山地東縁断層帯・沼田-砂川付近の断層帯 (沼田-砂川付近の断層帯)		7.5程度	Xランク		不明(注3)	不明(注3)	不明(注3)	不明(注3)	不明	
	当別断層	とうべつだんそ う	7.0程度	A*ランク		ほぼ0%~2%	ほぼ0%~4%	ほぼ0%~8%	0.1-1.5	7,500-15,000年程度 約11,000年前以後、約2,200年前以前	
	石狩低地東縁断層帯 (主部)	いしかりていち とうえんだんそ うたい	7.9程度	Zランク		ほぼ0%	ほぼ0%	ほぼ0%~ 0.003%	0.07-0.3	1,000-2,000年程度 1739年以後、1885年以前	
	石狩低地東縁断層帯 (南部)(注5)		7.7程度以上	Aランク		0.2%以下	0.3%以下	0.6%以下	不明	17,000年程度以上 不明	
	黒松内低地断層帯	くろまつないて いちだんそうた い	7.3程度以上	S*ランク		2%~5% 以下	3%~9% 以下	7%~20% 以下	1.0-1.6以下	3,600-5,000年程度以上 約5,900年前以後、約4,900年前以前	
	函館平野西縁断層帯	はこだてへい やせいえんだ んそうたい	7.0-7.5程度	A*ランク		ほぼ0%~1%	ほぼ0%~2%	ほぼ0%~3%	0.02-1.1	13,000-17,000年 14,000年前以後	
	サロベツ断層帯	さろべつ だんそうたい	7.6程度	S*ランク		4%以下	7%以下	10%以下	1.3以下	約4,000年-8,000年 約5,100年前以後	
	幌延断層帯	ほろのべだん そうたい	活断層ではないと判断される。								

注1: 確率値は有効数字1桁で記述している。ただし、30年確率が10%台の場合は2桁で記述する。また「ほぼ0%」とあるのは、 10^{-3} %未満の確率値を表す。

注2: 最新活動(地震発生)時期から評価時点までの経過時間を、平均活動間隔で割った値。最新の地震発生時期から評価時点までの経過時間が、平均活動間隔に達すると1.0となる。

注3: 平均活動間隔が判明していない等の理由より、地震発生確率及び地震後経過率を求めることができない。

注4: 活断層における今後30年以内の地震発生確率が3%以上を「Sランク」、0.1~3%を「Aランク」、0.1%未満を「Zランク」、不明(すぐに地震が起きることが否定できない)を「Xランク」と表記している。地震後経過率(注2)が0.7以上である活断層については、ランクに「*」を付記している。Zランクでも、活断層が存在すること自体、当該地域で大きな地震が発生する可能性を示す。

注5: 最新活動の時期が特定できていないため、通常の活断層評価で用いている計算方法(地震の発生確率が時間とともに変動するモデル: BPT分布モデル)ではなく、地震発生確率が時間的に不変とした考え方(ポアソン過程)により長期確率を求めている。同じ理由から、地震後経過率も求められない。

注6: 十勝平野断層帯(光地園断層)は、最新活動時期が十分絞り込まれておらず、通常的手法では平均活動間隔を求めることができない。ここでは、過去の活動時期から、約21000年前以後に2回の活動があったとして平均活動間隔を求めている。また、地震発生確率の計算に際しては、通常のBPT分布を用いることができるだけの信頼度がないと考えて、ポアソン過程で求めた。同じ理由から、地震後経過率も求められない。

■東北地方

都道府県	断層帯名 (起震断層/活動区間)	よみかた	長期評価で 予想した 地震規模 (マグニチュード)	我が国の主な 活断層における 相対的評価 (注4)		地震発生確率 (注1)			地震後 経過率 (注2)	平均活動間隔
				ランク	色	30年以内	50年以内	100年以内		最新活動時期
青森県	青森湾西岸断層帯 ^(注5)	あおりわんせい いがんさんそう たい	7.3程度	Aランク		0.5%~1%	0.8%~2%	2%~3%	不明	3,000-6,000年程度 不明
	津軽山地西縁断層帯 (北部) ^(注7)	つがるさんちせい えんさんそう たい	6.8-7.3程度	Xランク		不明 ^(注3)	不明 ^(注3)	不明 ^(注3)	不明 ^(注3)	不明 1766年の地震
	津軽山地西縁断層帯 (南部) ^(注7)	つがるさんちせい えんさんそう たい	7.1-7.3程度	Xランク		不明 ^(注3)	不明 ^(注3)	不明 ^(注3)	不明 ^(注3)	不明 1766年の地震
	折爪断層 ^(注8)	おりつめだん そう	(最大7.6程度)	Xランク		不明 ^(注3)	不明 ^(注3)	不明 ^(注3)	不明 ^(注3)	不明 不明
岩手県	折爪断層 ^(注8)	おりつめだん そう	(最大7.6程度)	Xランク		不明 ^(注3)	不明 ^(注3)	不明 ^(注3)	不明 ^(注3)	不明 不明
	北上低地西縁断層帯	きたかみてい ちせいえんさん そうたい	7.8程度	Zランク		ほぼ0%	ほぼ0%	ほぼ0%	0.2-0.3	16,000-26,000年 4,500年前頃
	雫石盆地西縁-真昼山地東縁断層帯 (雫石盆地西縁断層帯)	しずくいしぼん ちせいえん- まひるさんち とうえんさん そうたい	6.9程度	Xランク		不明 ^(注3)	不明 ^(注3)	不明 ^(注3)	不明 ^(注3)	不明 約2,800年前以後、14世紀以前
	雫石盆地西縁-真昼山地東縁断層帯 (真昼山地東縁断層帯/北部)	しずくいしぼん ちせいえん- まひるさんち とうえんさん そうたい	6.7-7.0程度	Zランク		ほぼ0%	ほぼ0%	ほぼ0%	0.004-0.02	約6,300-31,000年 1896年陸羽地震
	雫石盆地西縁-真昼山地東縁断層帯 (真昼山地東縁断層帯/南部)	しずくいしぼん ちせいえん- まひるさんち とうえんさん そうたい	6.9-7.1程度	Xランク		不明 ^(注3)	不明 ^(注3)	不明 ^(注3)	不明 ^(注3)	不明 不明
宮城県	長町-利府線断層帯 ^(注9)	ながまち-りふ せんさんそう たい	7.0-7.5程度	Aランク		1%以下	2%以下	3%以下	-	3,000年程度以上 約16,000年前以後
	福島盆地西縁断層帯	ふくしまぼんち せいえんさん そうたい	7.8程度	Zランク		ほぼ0%	ほぼ0%	ほぼ0%	0.2-0.3	8,000年程度 約2,200年前以後、3世紀以前
	双葉断層 ^(注10)	ふたばだん そう	6.8-7.5程度	Zランク		ほぼ0%	ほぼ0%	ほぼ0%	0.2-0.3	8,000-12,000年程度 約2400年前以後、2世紀以前
秋田県	雫石盆地西縁-真昼山地東縁断層帯 (雫石盆地西縁断層帯)	しずくいしぼん ちせいえん- まひるさんち とうえんさん そうたい	6.9程度	Xランク		不明 ^(注3)	不明 ^(注3)	不明 ^(注3)	不明 ^(注3)	不明 約2,800年前以後、14世紀以前
	雫石盆地西縁-真昼山地東縁断層帯 (真昼山地東縁断層帯/北部)	しずくいしぼん ちせいえん- まひるさんち とうえんさん そうたい	6.7-7.0程度	Zランク		ほぼ0%	ほぼ0%	ほぼ0%	0.004-0.02	約6,300-31,000年 1896年陸羽地震
	雫石盆地西縁-真昼山地東縁断層帯 (真昼山地東縁断層帯/南部)	しずくいしぼん ちせいえん- まひるさんち とうえんさん そうたい	6.9-7.1程度	Xランク		不明 ^(注3)	不明 ^(注3)	不明 ^(注3)	不明 ^(注3)	不明 不明
	能代断層帯	のしろだん そうたい	7.1程度以上	Zランク		ほぼ0%	ほぼ0%	ほぼ0%	0.1-0.2	1,900-2,900年程度 1694年能代地震
	横手盆地東縁断層帯 (北部)	よこてぼんち とうえんさん そうたい	7.2程度	Zランク		ほぼ0%	ほぼ0%	ほぼ0%	0.04	3,400年程度 1896年陸羽地震
	横手盆地東縁断層帯 (南部)	よこてぼんち とうえんさん そうたい	7.3程度	Xランク		不明 ^(注3)	不明 ^(注3)	不明 ^(注3)	不明 ^(注3)	不明 約6,000-5,000年前以後
	北由利断層	きたゆりだん そう	7.3程度	A*ランク		2%以下	3%以下	6%以下	0.8以下	3,400年-4,000年程度 約2,800年前以後
山形県	花輪東断層帯 ^(注11)	はなわひがし だんそうたい	7.0程度	Aランク		0.6%~1%	1%~2%	2%~3%	-	3,000-5,000年程度 約15,000年前以後
	新庄盆地断層帯 (西部) ^(注5)	しんじょうぼん ちだんそう たい	6.9程度	Aランク		0.6%	1%	2%	不明	4,700年程度 不明
	新庄盆地断層帯 (東部)	しんじょうぼん ちだんそう たい	7.1程度	S*ランク		5%以下	8%以下	20%以下	1.6以下	4,000年程度 約6,200年前以後
	山形盆地断層帯 (北部)	やまがたぼん ちだんそう たい	7.3程度	S*ランク		0.003%~8%	0.005%~10%	0.01%~20%	0.4-1.6	約2,500-4,000年 約3,900年前以後、約1,600年前以前
	山形盆地断層帯 (南部) ^(注5)	やまがたぼん ちだんそう たい	7.3程度	Aランク		1%	2%	4%	不明	2,500年程度 不明
	庄内平野東縁断層帯 (北部)	しょうないへい やとうえん さんそう たい	7.1程度	Zランク		ほぼ0%	ほぼ0%	ほぼ0%	0.09-0.1 もしくはそれ以上	1,000年-1,500年程度 1894年庄内地震
	庄内平野東縁断層帯 (南部)	しょうないへい やとうえん さんそう たい	6.9程度	S*ランク		ほぼ0%~6%	ほぼ0%~10%	ほぼ0%~20%	0.05-1.2	約2,500-4,600年 約3,000年前以後、18世紀以前
長井盆地西縁断層帯	ながいぼんち せいえんさん そうたい	7.7程度	Zランク		0.02%以下	0.04%以下	0.1%以下	0.5以下	5,000-6,300年程度 約2,400年前以後	

福島県	福島盆地西縁断層帯	ふくしまぼんち せいえんだん そうたい	7.8程度	Zランク		ほぼ0%	ほぼ0%	ほぼ0%	0.2-0.3	8,000年程度 約2,200年前以後、3世紀以前
	双葉断層 ^(注10)	ふたばだんそう	6.8-7.5程度	Zランク		ほぼ0%	ほぼ0%	ほぼ0%	0.2-0.3	8,000-12,000年程度 約2400年前以後、2世紀以前
	会津盆地西縁・東縁断層帯 (会津盆地東縁断層帯)	あいづぼんち せいえん・とう えんだんそうた い	7.7程度	Zランク		ほぼ0%~ 0.02%	ほぼ0%~ 0.03%	ほぼ0%~ 0.07%	0.3-0.5	約6,300-9,300年 約3,000年前以後、約2,600年前以前
	会津盆地西縁・東縁断層帯 (会津盆地西縁断層帯)		7.4程度	Zランク		ほぼ0%	ほぼ0%	ほぼ0%	0.04-0.06	約7,400-9,700年 1611年会津地震

注1： 確率値は有効数字1桁で記述している。ただし、30年確率が10%台の場合は2桁で記述する。また「ほぼ0%」とあるのは、 10^{-3} %未満の確率値を表す。

注2： 最新活動（地震発生）時期から評価時点までの経過時間を、平均活動間隔で割った値。最新の地震発生時期から評価時点までの経過時間が、平均活動間隔に達すると1.0となる。

注3： 平均活動間隔が判明していない等の理由より、地震発生確率及び地震後経過率を求めることができない。

注4： 活断層における今後30年以内の地震発生確率が3%以上を「Sランク」、0.1~3%を「Aランク」、0.1%未満を「Zランク」、不明（すぐに地震が起きることが否定できない）を「Xランク」と表記している。地震後経過率（注2）が0.7以上である活断層については、ランクに「*」を付記している。Zランクでも、活断層が存在すること自体、当該地域で大きな地震が発生する可能性を示す。

注5： 最新活動の時期が特定できていないため、通常の活断層評価で用いている計算方法（地震の発生確率が時間とともに変動するモデル：BPT分布モデル）ではなく、地震発生確率が時間的に不変とした考え方（ポアソン過程）により長期確率を求めている。同じ理由から、地震後経過率も求められない。

注7： 津軽山地西縁断層帯は、北部及び南部に分かれると評価されている。平均活動間隔が不明のため、地震発生確率は求めることができないが、最新活動時期が1766年であり、地震後経過年数が短いため、近い将来の地震発生確率はごく小さいと考えられる。なお、最新活動と考えられる地震の規模が断層帯の長さ比べて大きい場合、発生する地震の規模は幅を持った値としている。

注8： 折爪断層は、将来の活動可能性を明確にするために必要な資料が十分得られていない。鮮新世の地層を大きく変位させているので、第四紀に活動した断層であることはほぼ確かであると考えられているが、第四紀後期に活動を繰り返していることを示す確かな証拠はこれまで発見されておらず、特に、北部の辰ノ口撓曲においては第四紀後期の活動性は衰えている可能性もある。このため、発生する可能性がある地震の規模についても、便宜的に最大値を記載しているものの、この値は断層全体が一つの区間として活動した場合の試算値に過ぎないことに注意する必要がある。

注9： 長町一利府線断層帯は、最新活動時期が約16000年前以後と求められているが、平均活動間隔3000年に対して十分に絞り込まれていない。このため、地震発生確率の計算に際しては、ポアソン過程を用いた。同じ理由から、地震後経過率も求めてない。

注10： 平成23年（2011年）東北地方太平洋沖地震に伴い、糸魚川-静岡構造線断層帯（牛伏寺断層）、立川断層帯、双葉断層、三浦半島断層群、阿寺断層帯（主部/北部（萩原断層））では、地震発生確率が表の値より高くなっている可能性がある。

注11： 花輪東断層帯は、最新活動時期が約15000年前以後と求められているが、平均活動間隔3000年-5000年程度に対して十分に絞り込まれていない。このため、地震発生確率の計算に際しては、ポアソン過程を用いた。同じ理由から、地震後経過率も求めてない。

■ 関東・中部地方

都道府県	断層帯名 (起震断層/活動区間)	よみかた	長期評価で 予想した 地震規模 (マグニチュード)	我が国の主な 活断層における 相対的評価 ^(注4)		地震発生確率 ^(注1)			地震後 経過率 ^(注2)	平均活動間隔
				ランク	色	30年以内	50年以内	100年以内		最新活動時期
栃木県	関谷断層	せきやだんそう	7.5程度	Zランク		ほぼ0%	ほぼ0%	ほぼ0%	0.08-0.3	約2,600-4,100年 14世紀以後、17世紀以前
	大久保断層 ^(注5)	おおくぼだん そう	7.0程度 以上	Aランク		0.6%	1%	2%	不明	5,000年程度 不明
群馬県	大久保断層 ^(注5)	おおくぼだん そう	7.0程度 以上	Aランク		0.6%	1%	2%	不明	5,000年程度 不明
	深谷断層帯 ^(注25)		7.9程度	Aランク		ほぼ0%~0.1%	ほぼ0%~0.2%	ほぼ0%~0.5%	0.2-0.6	10,000-25,000年程度 約6,200年前以後、約5,800年前以前
	綾瀬川断層 ^(注25) (鴻巣-伊奈区間)	ふかやだん たい あやせがわだ んそう	7.0程度	Zランク		ほぼ0%	ほぼ0%	ほぼ0%	0.1-0.3	45,000年-71,000年程度 約15,000年前以後、約9,000年前以前
	綾瀬川断層 ^(注25) (伊奈-川口区間)		7.0程度	Xランク		不明 ^(注3)	不明 ^(注3)	不明 ^(注3)	不明 ^(注3)	不明 不明
埼玉県	深谷断層帯 ^(注25)		7.9程度	Aランク		ほぼ0%~0.1%	ほぼ0%~0.2%	ほぼ0%~0.5%	0.2-0.6	10,000-25,000年程度 約6,200年前以後、約5,800年前以前
	綾瀬川断層 ^(注25) (鴻巣-伊奈区間)	ふかやだん たい あやせがわだ んそう	7.0程度	Zランク		ほぼ0%	ほぼ0%	ほぼ0%	0.1-0.3	45,000年-71,000年程度 約15,000年前以後、約9,000年前以前
	綾瀬川断層 ^(注25) (伊奈-川口区間)		7.0程度	Xランク		不明 ^(注3)	不明 ^(注3)	不明 ^(注3)	不明 ^(注3)	不明 不明
	立川断層帯 ^(注10)	たちかわだん そうたい	7.4程度	A*ランク		0.5%~2%	0.8%~4%	2%~7%	0.9-2.0	10,000-15,000年程度 約20,000年前以後、13,000年前以前
	荒川断層	あらかわだん そう	活断層ではないと判断される。							
千葉県	鴨川低地断層帯 ^(注12)	かもがわてい ちだんそうたい	概ね7.2	Xランク		不明 ^(注3)	不明 ^(注3)	不明 ^(注3)	不明 ^(注3)	不明 不明
	東京湾北縁断層	とうきょうわん ほくえんだん そう	活断層ではないと判断される。							
東京都	立川断層帯 ^(注10)	たちかわだん そうたい	7.4程度	A*ランク		0.5%~2%	0.8%~4%	2%~7%	0.9-2.0	10,000-15,000年程度 約20,000年前以後、13,000年前以前
神奈川県	伊勢原断層	いせはらだん そう	7.0程度	Zランク		ほぼ0%~ 0.003%	ほぼ0%~ 0.006%	ほぼ0%~ 0.01%	0.05-0.4	4,000-6,000年程度 5世紀以後、18世紀初頭以前
	塩沢断層帯 ^{(注5)(注26)}	しおざわだん そうたい	6.8程度 以上	Sランク		4%以下	6%以下	10%以下	不明	800年程度以上 不明
	平山-松田北断層帯 ^(注26)	ひらやま- まつだきただ んそうたい	6.8程度	A*ランク		0.09%~0.6%	0.2%~1%	0.3%~2%	0.5-0.7	4,000-5,000年程度 約2,700年前
	国府津-松田断層帯 ^(注26)	こうづ-まつ だだんそうたい	-	-		-	-	-	-	(分岐断層)
	三浦半島断層群 (主部/武山断層帯) ^(注10)		6.6程度 もしくはそれ以上	S*ランク		6%~11%	10%~20%	20%~30%	1.0-1.4	1,600年-1,900年程度 約2,300年前以後、約1,900年前以前
	三浦半島断層群 (主部/衣笠・北武断層帯) ^(注10)	みうらはん どうだん そうぐん	6.7程度 もしくはそれ以上	S*ランク		ほぼ0%~3%	ほぼ0%~5%	ほぼ0%~10%	0.3-0.8	1,900年-4,900年程度 6-7世紀
	三浦半島断層群 (南部)		6.1程度 もしくはそれ以上	Xランク		不明 ^(注3)	不明 ^(注3)	不明 ^(注3)	不明 ^(注3)	不明 約26,000年前以後、約22,000年前以前
	北伊豆断層帯	きたいずだん そうたい	7.3程度	Zランク		ほぼ0%	ほぼ0%	ほぼ0%	0.06-0.07	約1,400-1,500年 1930年北伊豆地震
新潟県	櫛形山脈断層帯	くしがたさん みやくだん そうたい	6.8程度	S*ランク		0.3%~5%	0.6%~8%	1%~20%	0.6-1.1	約2,800-4,200年 約3,200年前以後、約2,600年前以前
	月岡断層帯	つきおかだん そうたい	7.3程度	A*ランク		ほぼ0%~1%	ほぼ0%~2%	ほぼ0%~3%	0.1以下-0.9	7,500年以上 約6,500年前以後、約900年前以前
	長岡平野西縁断層帯	ながおかへい やせいえんだ んそうたい	8.0程度	S*ランク		3%以下	4%以下	10%以下	0.7以下	約1,200-3,700年 13世紀以後
	十日町断層帯 (西部)	とおかまちだ んそうたい	7.4程度	S*ランク		3%以上	5%以上	10%以上	0.9以上	3,300年程度 約3,100年前以前
	十日町断層帯 (東部) ^(注5)		7.0程度	Aランク		0.4%~0.7%	0.6%~1%	1%~2%	不明	4,000-8,000年程度 不明 ^(注13)
	高田平野断層帯 (高田平野東縁断層帯) ^(注14)	たかだへい やだん そうたい	7.2程度	S*ランク		ほぼ0%~8%	ほぼ0%~10%	ほぼ0%~20%	0.08-1.5	2,300年程度 約3,500年前以後、19世紀以前
	高田平野断層帯 (高田平野西縁断層帯)		7.3程度	Zランク		ほぼ0%	ほぼ0%	ほぼ0%	0.06-0.1	2,200-4,800年程度 1751年の地震

	六日町断層帯 (北部)(ケース1) ^(注15)	むいかまちだ んそうたい	7.1程度	Aランク	0.4%~0.9%	0.7%~2%	1%~3%	-	約3,200-7,600年				
	六日町断層帯 (北部)(ケース2) ^(注15)		7.1程度	Zランク					ほぼ0%	ほぼ0%	ほぼ0%	0.005-0.007 もしくはそれ以上	約3,200-4,000年 もしくはそれ以下 2004年中越地震
	六日町断層帯 (南部)		7.3程度	Zランク					ほぼ0%~ 0.01%	ほぼ0%~ 0.02%	ほぼ0%~ 0.05%	0.3-0.5	約6,200-7,200年 約2,900年前以後、約2,000年前以前
富山県	跡津川断層帯	あとつがわだ んそうたい	7.9程度	Zランク	ほぼ0%	ほぼ0%	ほぼ0%	0.06-0.07	約2,300-2,700年				
	牛首断層帯	うしくびだんそ うたい	7.7程度	Zランク					約5,000-7,100年 11世紀以後、12世紀以前				
	庄川断層帯	しょうかわだん そうたい	7.9程度	Zランク					約3,600-6,900年 11世紀以後、16世紀以前				
	砺波平野断層帯・呉羽山断層帯 (砺波平野断層帯東部)	となみへいや だんそうたい・ くれはやまだん そうたい	7.0程度	S*ランク					0.04%~6%	0.06%~10%	0.1%~20%	0.5-1.4	3,000-7,000年程度 約4,300年前以後、約3,600年前以前
	砺波平野断層帯・呉羽山断層帯 (砺波平野断層帯西部)		7.2程度	A*ランク					ほぼ0%~2% もしくはそれ以上	ほぼ0%~4% もしくはそれ以上	ほぼ0%~8% もしくはそれ以上	0.2-1.2 もしくはそれ以上	約6,000-12,000年 もしくはそれ以下 約6,900年前以後、1世紀以前
	砺波平野断層帯・呉羽山断層帯 (呉羽山断層帯)		7.2程度	S*ランク					ほぼ0%~5%	ほぼ0%~8%	ほぼ0%~20%	0.3-1.2	3,000-5,000年程度 約3,500年前以後、7世紀以前
	魚津断層帯 ^(注5)	うおづだんそ うたい	7.3程度	Aランク					0.4%以上	0.6%以上	1%以上	不明	8,000年程度以下 不明
石川県	庄川断層帯	しょうかわだん そうたい	7.9程度	Zランク	ほぼ0%	ほぼ0%	ほぼ0%	0.06-0.3	約3,600-6,900年 11世紀以後、16世紀以前				
	邑知潟断層帯 ^(注17)	おうちがただん そうたい	7.6程度	Aランク					2%	3%~4%	5%~8%	-	1,200-1,900年程度 約3,200年前以後、9世紀以前
	森本・富樫断層帯	もりもと・とがし だんそうたい	7.2程度	S*ランク					2%~8%	3%~10%	7%~30%	0.7-1.2	1,700-2,200年程度 約2,000年前以後、4世紀以前
	福井平野東縁断層帯 (主部)	ふくいへいやと うえんだんそ うたい	7.6程度	Zランク					ほぼ0%~ 0.07%	ほぼ0%~0.1%	ほぼ0%~0.3%	0.3-0.5	約6,300-10,000年 約3,400年前以後、約2,900年前以前
	福井平野東縁断層帯 (西部) ^(注18)		7.1程度	Xランク					不明 ^(注3)	不明 ^(注3)	不明 ^(注3)	不明 ^(注3)	不明 1948年福井地震
福井県	福井平野東縁断層帯 (主部)	ふくいへいやと うえんだんそ うたい	7.6程度	Zランク	ほぼ0%~ 0.07%	ほぼ0%~0.1%	ほぼ0%~0.3%	0.3-0.5	約6,300-10,000年 約3,400年前以後、約2,900年前以前				
	福井平野東縁断層帯 (西部) ^(注18)		7.1程度	Xランク	不明 ^(注3)	不明 ^(注3)	不明 ^(注3)	不明 ^(注3)	不明 1948年福井地震				
	濃尾断層帯 (温見断層/北西部)	のうびだんそ うたい	6.8程度	Zランク	ほぼ0%	ほぼ0%	ほぼ0%	0.06	約2,200-2,400年 1891年濃尾地震				
	濃尾断層帯 (温見断層/南東部)		7.0程度	Xランク	不明 ^(注3)	不明 ^(注3)	不明 ^(注3)	不明 ^(注3)	不明 不明				
	濃尾断層帯 (主部/根尾谷断層帯)		7.3程度	Zランク	ほぼ0%	ほぼ0%	ほぼ0%	0.04-0.06	約2,100-3,600年 1891年濃尾地震				
	濃尾断層帯 (主部/梅原断層帯)		7.4程度	Zランク	ほぼ0%	ほぼ0%	ほぼ0%	0.009-0.01	約14,000-15,000年 1891年濃尾地震				
	濃尾断層帯 (主部/三田洞断層帯)		7.0程度	Xランク	不明 ^(注3)	不明 ^(注3)	不明 ^(注3)	不明 ^(注3)	不明 不明				
	濃尾断層帯 (揖斐川断層帯)		7.1程度	Xランク	不明 ^(注3)	不明 ^(注3)	不明 ^(注3)	不明 ^(注3)	不明 1世紀以後、10世紀以前				
	濃尾断層帯 (武儀川断層)		7.3程度	Xランク	不明 ^(注3)	不明 ^(注3)	不明 ^(注3)	不明 ^(注3)	不明 不明				
	柳ヶ瀬・関ヶ原断層帯 (主部/北部)		7.6程度	Zランク	ほぼ0%	ほぼ0%	ほぼ0%	0.1-0.2	約2,300-2,700年 17世紀頃				
	柳ヶ瀬・関ヶ原断層帯 (主部/中部)	やながせ・せき がはらだんそ うたい	6.6程度	Xランク	不明 ^(注3)	不明 ^(注3)	不明 ^(注3)	不明 ^(注3)	不明 約7,200年前以後、約7,000年前以前				
	柳ヶ瀬・関ヶ原断層帯 (主部/南部)		7.6程度	Xランク	不明 ^(注3)	不明 ^(注3)	不明 ^(注3)	不明 ^(注3)	不明 約4,900年前以後、15世紀以前				
	柳ヶ瀬・関ヶ原断層帯 (浦底-柳ヶ瀬山断層帯)		7.2程度	Xランク	不明 ^(注3)	不明 ^(注3)	不明 ^(注3)	不明 ^(注3)	不明 不明				

	野坂・集福寺断層帯 (野坂断層帯)	のさか・しゅう ふくじだんそう たい	7.3程度	Zランク	ほぼ0% もしくはそれ以上	ほぼ0% もしくはそれ以上	ほぼ0% もしくはそれ以上	0.04-0.1 もしくはそれ以上	約5,600-7,600年 もしくはそれ以下
	野坂・集福寺断層帯 (集福寺断層)		6.5程度	Xランク	不明 ^(注3)	不明 ^(注3)	不明 ^(注3)	不明 ^(注3)	不明 不明
	湖北山地断層帯 (北西部)	こほくさんちだ んそうたい	7.2程度	Zランク	ほぼ0%	ほぼ0%	ほぼ0%~ 0.001%	0.2-0.3	約3,000-4,000年 11-14世紀
	湖北山地断層帯 (南東部)		6.8程度	Zランク	ほぼ0%	ほぼ0%	ほぼ0%	0.05-0.09	概ね7,000年程度 15-17世紀
	三方・花折断層帯 (三方断層帯)	みかた・はなお れだんそうたい	7.2程度	Zランク	ほぼ0%	ほぼ0%	ほぼ0%	0.06-0.1	約3,800年-約6,300年 1662年の地震
	三方・花折断層帯 (花折断層帯/北部) ^(注19)		7.2程度	Xランク	不明 ^(注3)	不明 ^(注3)	不明 ^(注3)	不明 ^(注3)	不明 1662年の地震
	三方・花折断層帯 (花折断層帯/中南部)		7.3程度	A*ランク	ほぼ0%~0.6%	ほぼ0%~1%	ほぼ0%~2%	0.2-0.7	約4,200-6,500年 約2,800年前以後、6世紀以前
山梨県	曾根丘陵断層帯 ^(注20)	そねきゅうりょう だんそうたい	7.3程度	Aランク	1%	2%	3%~5%	-	概ね2,000-3,000年 約10,000年前以後
	糸魚川-静岡構造線断層帯 (北部区間) ^(注21)	いといがわーし ずおかこうぞう せんだんそうた い	7.7程度	S*ランク	0.009%~16%	0.02%~20%	0.05%~40%	0.4-1.3	1,000年-2,400年程度 約1,300年前以降、約1,000年前以前
	糸魚川-静岡構造線断層帯 (中北部区間) ^(注10)		7.6程度	S*ランク	14%~30%	20%~50%	40%~70%	1.0-2.0	600-800年程度 約1,200年前以降、約800年前以前
	糸魚川-静岡構造線断層帯 (中南部区間) ^(注21)		7.4程度	S*ランク	0.9%~8%	2%~10%	4%~30%	0.6-1.0	1,300年-1,500年程度 約1,300年前以降、約900年前以前
	糸魚川-静岡構造線断層帯 (南部区間) ^(注21)		7.6程度	Aランク	ほぼ0%~0.1%	ほぼ0%~0.2%	ほぼ0%~0.4%	0.2-0.5	4,600年-6,700年程度 約2,500年前以降、約1,400年前以前
	身延断層		みのぶだんそう	7.0程度	Xランク	不明 ^(注3)	不明 ^(注3)	不明 ^(注3)	不明 ^(注3)
長野県	糸魚川-静岡構造線断層帯 (北部区間) ^(注21)	いといがわーし ずおかこうぞう せんだんそうた い	7.7程度	S*ランク	0.009%~16%	0.02%~20%	0.05%~40%	0.4-1.3	1,000年-2,400年程度 約1,300年前以降、約1,000年前以前
	糸魚川-静岡構造線断層帯 (中北部区間) ^(注10)		7.6程度	S*ランク	14%~30%	20%~50%	40%~70%	1.0-2.0	600-800年程度 約1,200年前以降、約800年前以前
	糸魚川-静岡構造線断層帯 (中南部区間) ^(注21)		7.4程度	S*ランク	0.9%~8%	2%~10%	4%~30%	0.6-1.0	1,300年-1,500年程度 約1,300年前以降、約900年前以前
	糸魚川-静岡構造線断層帯 (南部区間) ^(注21)		7.6程度	Aランク	ほぼ0%~0.1%	ほぼ0%~0.2%	ほぼ0%~0.4%	0.2-0.5	4,600年-6,700年程度 約2,500年前以降、約1,400年前以前
	長野盆地西縁断層帯 ^(注16) (飯山-千曲区間)		ながのぼんち せいえんだん そうたい	7.4-7.8 程度	Zランク	ほぼ0%	ほぼ0%	ほぼ0%	0.07-0.2
	長野盆地西縁断層帯 ^(注16) (麻績区間)		6.8程度	Xランク	不明 ^(注3)	不明 ^(注3)	不明 ^(注3)	不明 ^(注3)	不明 不明
	木曽山脈西縁断層帯 (主部/北部)	きそさんみやく せいえんだん そうたい	7.5程度	Zランク	ほぼ0%	ほぼ0%	ほぼ0%	0.08-0.1	約6,400-9,100年 13世紀頃
	木曽山脈西縁断層帯 (主部/南部)		6.3程度	S*ランク	ほぼ0%~4%	ほぼ0%~7%	ほぼ0%~10%	0.2-1.4	約4,500-24,000年 約6,500年前以後、約3,800年前以前
	木曽山脈西縁断層帯 (清内路峠断層帯)		7.4程度	Xランク	不明 ^(注3)	不明 ^(注3)	不明 ^(注3)	不明 ^(注3)	不明 不明
	境峠・神谷断層帯 (主部) ^(注22)	さかいとうげ・ かみやだんそう たい	7.6程度	S*ランク	0.02%~13%	0.04%~20%	0.09%~40%	0.5-2より大	約1,800-5,200年 約4,900年前以後、約2,500年前以前
	境峠・神谷断層帯 (霧訪山-奈良井断層帯)		7.2程度	Xランク	不明 ^(注3)	不明 ^(注3)	不明 ^(注3)	不明 ^(注3)	不明 不明
	伊那谷断層帯 (主部) ^(注23)	いなだにだん そうたい	8.0程度	Zランク	ほぼ0%	ほぼ0%	ほぼ0%	0.05-0.1	約5,200-6,400年 14世紀以後、18世紀以前
	伊那谷断層帯 (南東部)		7.3程度	Xランク	不明 ^(注3)	不明 ^(注3)	不明 ^(注3)	不明 ^(注3)	不明 不明
	阿寺断層帯 (主部/北部) ^(注10)	あてらだんそう たい	6.9程度	S*ランク	6%~11%	10%~20%	20%~30%	1.2-1.9	約1,800-2,500年 約3,400年前以後、約3,000年前以前
	阿寺断層帯 (主部/南部)		7.8程度	Zランク	ほぼ0%	ほぼ0%	ほぼ0%	0.3	約1,700年 1586年天正地震
	阿寺断層帯 (佐見断層帯)		7.2程度	Xランク	不明 ^(注3)	不明 ^(注3)	不明 ^(注3)	不明 ^(注3)	不明 不明
阿寺断層帯 (白川断層帯)	7.3程度		Xランク	不明 ^(注3)	不明 ^(注3)	不明 ^(注3)	不明 ^(注3)	不明 不明	

岐阜県	木曾山脈西縁断層帯 (主部/北部)	きそさんみやく せいえんだん そうたい	7.5程度	Zランク		ほぼ0%	ほぼ0%	ほぼ0%	0.08-0.1	約6,400-9,100年 13世紀頃
	木曾山脈西縁断層帯 (主部/南部)		6.3程度	S*ランク		ほぼ0%~4%	ほぼ0%~7%	ほぼ0%~10%	0.2-1.4	約4,500-24,000年 約6,500年前以後、約3,800年前以前
	木曾山脈西縁断層帯 (清内路峠断層帯)		7.4程度	Xランク		不明 ^(注3)	不明 ^(注3)	不明 ^(注3)	不明 ^(注3)	不明 不明
	跡津川断層帯	あとつがわだ んそうたい	7.9程度	Zランク		ほぼ0%	ほぼ0%	ほぼ0%	0.06-0.07	約2,300-2,700年 1858年飛越地震
	高山・大原断層帯 (国府断層帯)	たかやま・おっ ばらだんそうた い	7.2程度	S*ランク		ほぼ0%~5%	ほぼ0%~7%	ほぼ0%~10%	0.07-1.3	約3,600-4,300年 約4,700年前以後、約300年前以前
	高山・大原断層帯 (高山断層帯) ^(注5)		7.6程度	Aランク		0.7%	1%	2%	不明	4,000年程度 不明
	高山・大原断層帯 (猪之鼻断層帯)		7.1程度	Xランク		不明 ^(注3)	不明 ^(注3)	不明 ^(注3)	不明 ^(注3)	不明 不明
	牛首断層帯	うしくびだんそ うたい	7.7程度	Zランク		ほぼ0%	ほぼ0%	ほぼ0%	0.1-0.2	約5,000-7,100年 11世紀以後、12世紀以前
	庄川断層帯	しょうかわだん そうたい	7.9程度	Zランク		ほぼ0%	ほぼ0%	ほぼ0%	0.06-0.3	約3,600-6,900年 11世紀以後、16世紀以前
	阿寺断層帯 (主部/北部) ^(注10)	あてらだんそう たい	6.9程度	S*ランク		6%~11%	10%~20%	20%~30%	1.2-1.9	約1,800-2,500年 約3,400年前以後、約3,000年前以前
	阿寺断層帯 (主部/南部)		7.8程度	Zランク		ほぼ0%	ほぼ0%	ほぼ0%	0.3	約1,700年 1586年天正地震
	阿寺断層帯 (佐見断層帯)		7.2程度	Xランク		不明 ^(注3)	不明 ^(注3)	不明 ^(注3)	不明 ^(注3)	不明 不明
	阿寺断層帯 (白川断層帯)		7.3程度	Xランク		不明 ^(注3)	不明 ^(注3)	不明 ^(注3)	不明 ^(注3)	不明 不明
	屏風山・恵那山一猿投山断層帯 (屏風山断層帯) ^(注5)	びょうぶやま・ えなさんーさな げやまだんそう たい	6.8程度	Aランク		0.2%~0.7%	0.4%~1%	0.8%~2%	不明	4,000-12,000年程度 不明
	屏風山・恵那山一猿投山断層帯 (赤河断層帯)		7.1程度	Xランク		不明 ^(注3)	不明 ^(注3)	不明 ^(注3)	不明 ^(注3)	不明 不明
	屏風山・恵那山一猿投山断層帯 (恵那山一猿投山北断層帯)		7.7程度	A*ランク		ほぼ0%~2%	ほぼ0%~3%	0.001%~6%	0.4-1.1	約7,200-14,000年 約7,600年前以後、約5,400年前以前
	屏風山・恵那山一猿投山断層帯 (猿投一高浜断層帯)		7.7程度	Zランク		ほぼ0%	ほぼ0%	ほぼ0%	0.4	40,000年程度 約14,000年前頃
	屏風山・恵那山一猿投山断層帯 (加木屋断層帯) ^(注5)		7.4程度	Aランク		0.1%	0.2%	0.3%	不明	30,000年程度 不明
	長良川上流断層帯	ながらがわじよ うりゆうだんそ うたい	7.3程度	Xランク		不明 ^(注3)	不明 ^(注3)	不明 ^(注3)	不明 ^(注3)	不明 不明
	濃尾断層帯 (温見断層/北西部)	のうびだんそう たい	6.8程度	Zランク		ほぼ0%	ほぼ0%	ほぼ0%	0.06	約2,200-2,400年 1891年濃尾地震
	濃尾断層帯 (温見断層/南東部)		7.0程度	Xランク		不明 ^(注3)	不明 ^(注3)	不明 ^(注3)	不明 ^(注3)	不明 不明
	濃尾断層帯 (主部/根尾谷断層帯)		7.3程度	Zランク		ほぼ0%	ほぼ0%	ほぼ0%	0.04-0.06	約2,100-3,600年 1891年濃尾地震
	濃尾断層帯 (主部/梅原断層帯)		7.4程度	Zランク		ほぼ0%	ほぼ0%	ほぼ0%	0.009-0.01	約14,000-15,000年 1891年濃尾地震
	濃尾断層帯 (主部/三田洞断層帯)		7.0程度	Xランク		不明 ^(注3)	不明 ^(注3)	不明 ^(注3)	不明 ^(注3)	不明 不明
	濃尾断層帯 (揖斐川断層帯)		7.1程度	Xランク		不明 ^(注3)	不明 ^(注3)	不明 ^(注3)	不明 ^(注3)	不明 1世紀以後、10世紀以前
	濃尾断層帯 (武儀川断層)		7.3程度	Xランク		不明 ^(注3)	不明 ^(注3)	不明 ^(注3)	不明 ^(注3)	不明 不明

	柳ヶ瀬・関ヶ原断層帯 (主部/北部)	やながせ・せきが はらだんそう たい	7.6程度	Zランク		ほぼ0%	ほぼ0%	ほぼ0%	0.1-0.2	約2,300-2,700年 17世紀頃
	柳ヶ瀬・関ヶ原断層帯 (主部/中部)		6.6程度	Xランク		不明 ^(注3)	不明 ^(注3)	不明 ^(注3)	不明 ^(注3)	不明 約7,200年前以後、約7,000年前以前
	柳ヶ瀬・関ヶ原断層帯 (主部/南部)		7.6程度	Xランク		不明 ^(注3)	不明 ^(注3)	不明 ^(注3)	不明 ^(注3)	不明 約4,900年前以後、15世紀以前
	柳ヶ瀬・関ヶ原断層帯 (浦底-柳ヶ瀬山断層帯)		7.2程度	Xランク		不明 ^(注3)	不明 ^(注3)	不明 ^(注3)	不明 ^(注3)	不明 不明
	養老-桑名-四日市断層帯	ようろう-くわ な-よっかいち だんそうたい	8程度	Aランク		ほぼ0%~0.8%	ほぼ0%~1%	ほぼ0%~4%	0.2-0.6	1,400-1,900年 13世紀以後-16世紀以前
	鈴鹿東縁断層帯	すずかとうえん だんそうたい	7.5程度	Zランク		ほぼ0%~ 0.07%	ほぼ0%~0.1%	ほぼ0%~0.2%	0.2-0.5	約6,500-12,000年 約3,500年前以後、約2,800年前以前
	岐阜-一宮断層帯	ぎふ-いちの みやだんそうた い	活断層ではないと判断される。							
静岡県	塩沢断層帯 ^{(注5)(注26)}	しおざわだん そうたい	6.8程度 以上	Sランク		4%以下	6%以下	10%以下	不明	800年程度以上 不明
	平山-松田北断層帯 ^(注26)	ひらやま-ま つたきただん そうたい	6.8程度	A*ランク		0.09%~0.6%	0.2%~1%	0.3%~2%	0.5-0.7	4,000-5,000年程度 約2,700年前
	国府津-松田断層帯 ^(注26)	こうづ-まつだ だんそうたい	-	-	-	-	-	-	-	(分岐断層)
	身延断層	みのぶだんそう	7.0程度	Xランク		不明 ^(注3)	不明 ^(注3)	不明 ^(注3)	不明 ^(注3)	不明 不明
	北伊豆断層帯	きたいずだん そうたい	7.3程度	Zランク		ほぼ0%	ほぼ0%	ほぼ0%	0.06-0.07	約1,400-1,500年 1930年北伊豆地震
愛知県	屏風山・恵那山-猿投山断層帯 (屏風山断層帯) ^(注5)	びょうぶやま・ えなさん-さな げやまだんそう たい	6.8程度	Aランク		0.2%~0.7%	0.4%~1%	0.8%~2%	不明	4,000-12,000年程度 不明
	屏風山・恵那山-猿投山断層帯 (赤河断層帯)		7.1程度	Xランク		不明 ^(注3)	不明 ^(注3)	不明 ^(注3)	不明 ^(注3)	不明 不明
	屏風山・恵那山-猿投山断層帯 (恵那山-猿投山北断層帯)		7.7程度	A*ランク		ほぼ0%~2%	ほぼ0%~3%	0.001%~6%	0.4-1.1	約7,200-14,000年 約7,600年前以後、約5,400年前以前
	屏風山・恵那山-猿投山断層帯 (猿投-高浜断層帯)		7.7程度	Zランク		ほぼ0%	ほぼ0%	ほぼ0%	0.4	40,000年程度 約14,000年前頃
	屏風山・恵那山-猿投山断層帯 (加木屋断層帯) ^(注5)		7.4程度	Aランク		0.1%	0.2%	0.3%	不明	30,000年程度 不明
	伊勢湾断層帯 (主部/北部)	いせわんだん そうたい	7.2程度	Zランク		ほぼ0%	ほぼ0%	ほぼ0%	0.03-0.1	10,000年-15,000年程度 概ね1000年前以後-500年前以前
	伊勢湾断層帯 (主部/南部)		6.9程度	Zランク		ほぼ0%~ 0.002%	ほぼ0%~ 0.004%	ほぼ0%~ 0.01%	0.2-0.4	5,000年-10,000年程度 概ね2,000年前以後-1,500年前以前
	伊勢湾断層帯 (白子-野間断層)		7.0程度	A*ランク		0.2%~0.8%	0.3%~1%	0.7%~3%	0.6-0.8	8,000年程度 概ね6,500年前以後-5,000年前以前
	岐阜-一宮断層帯	ぎふ-いちの みやだんそうた い	活断層ではないと判断される。							
三重県	養老-桑名-四日市断層帯	ようろう-くわ な-よっかいち だんそうたい	8程度	Aランク		ほぼ0%~0.8%	ほぼ0%~1%	ほぼ0%~3%	0.2-0.6	1,400-1,900年 13世紀以後-16世紀以前
	鈴鹿東縁断層帯	すずかとうえん だんそうたい	7.5程度	Zランク		ほぼ0%~ 0.07%	ほぼ0%~0.1%	ほぼ0%~0.2%	0.2-0.5	約6,500-12,000年 約3,500年前以後、約2,800年前以前
	頓宮断層	とんぐうだんそ う	7.3程度	A*ランク		1%以下	2%以下	4%以下	1.0以下	約10,000年以上 約10,000年前以後、7世紀以前
	布引山地東縁断層帯 (東部)	ぬのびきさんち とうえんだんそ うたい	7.6程度	Zランク		0.001%	0.002%	0.005%	0.4	25,000年程度 約11,000年前頃
	布引山地東縁断層帯 (西部)		7.4程度	A*ランク		ほぼ0%~1%	ほぼ0%~2%	ほぼ0%~4%	0.02-1.6	17,000年程度 約28,000年前以後、約400年前以前
	木津川断層帯	きづがわだん そうたい	7.3程度	Zランク		ほぼ0%	ほぼ0%	ほぼ0%	0.007-0.04	約4,000-25,000年 1854年伊賀上野地震
	伊勢湾断層帯 (主部/北部)	いせわんだん そうたい	7.2程度	Zランク		ほぼ0%	ほぼ0%	ほぼ0%	0.03-0.1	10,000年-15,000年程度 概ね1000年前以後-500年前以前
	伊勢湾断層帯 (主部/南部)		6.9程度	Zランク		ほぼ0%~ 0.002%	ほぼ0%~ 0.004%	ほぼ0%~ 0.01%	0.2-0.4	5,000年-10,000年程度 概ね2,000年前以後-1,500年前以前
伊勢湾断層帯 (白子-野間断層)	7.0程度		A*ランク		0.2%~0.8%	0.3%~1%	0.7%~3%	0.6-0.8	8,000年程度 概ね6,500年前以後-5,000年前以前	

(参考) 富士川河口断層帯の長期評価の概要 (算定基準日 令和6年(2024年)1月1日) (注24)

(駿河トラフで発生した海溝型地震に伴って活動したと考える場合の地震発生確率等)

	断層帯名 (起震断層/活動区間)	長期評価で 予想した 地震規模 (マグニチュード)	我が国の主な 活断層における 相対的評価 (注4)		地震発生確率 (注1)			地震後 経過率 (注2)	平均活動間隔	
			ランク	色	30年以内	50年以内	100年以内		最新活動時期	
静岡県	富士川河口断層帯 (ケースa)	ふじがわかこう だんそうたい	8.0程度	S*ランク	■	10%~18%	20%~30%	30%~50%	0.9-2より大	約150-300年 13世紀後半以後、18世紀前半以前
	富士川河口断層帯 (ケースb)		8.0程度	S*ランク		2%~11%もしくは はそれ以下	4%~20%もしくは はそれ以下	8%~30%もしくは はそれ以下	0.7-1.2もしくは はそれ以下	約1,300-1,600年 6世紀以後、9世紀以前、もしくはそれ以後

- 注1: 確率値は有効数字1桁で記述している。ただし、30年確率が10%台の場合は2桁で記述する。また「ほぼ0%」とあるのは、 10^{-3} %未満の確率値を表す。
- 注2: 最新活動(地震発生)時期から評価時点までの経過時間を、平均活動間隔で割った値。最新の地震発生時期から評価時点までの経過時間が、平均活動間隔に達すると1.0となる。
- 注3: 平均活動間隔が判明していない等の理由より、地震発生確率及び地震後経過率を求めることができない。
- 注4: 活断層における今後30年以内の地震発生確率が3%以上を「Sランク」、0.1~3%を「Aランク」、0.1%未満を「Zランク」、不明(すぐに地震が起きることが否定できない)を「Xランク」と表記している。地震後経過率(注2)が0.7以上である活断層については、ランクに「*」を付記している。Zランクでも、活断層が存在すること自体、当該地域で大きな地震が発生する可能性を示す。
- 注5: 最新活動の時期が特定できていないため、通常の活断層評価で用いている計算方法(地震の発生確率が時間とともに変動するモデル: BPT分布モデル)ではなく、地震発生確率が時間的に不変とした考え方(ポアソン過程)により長期確率を求めている。同じ理由から、地震後経過率も求められない。
- 注10: 平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震に伴い、糸魚川-静岡構造線断層帯(牛伏寺断層)、立川断層帯、双葉断層、三浦半島断層群、阿寺断層帯(主部/北部(萩原断層))では、地震発生確率が表の値より高くなっている可能性がある。
- 注12: 鴨川低地断層帯に関しては、活断層であるかどうかの確実な証拠に乏しく、活断層としての存在そのものについて疑問視した調査結果も報告されている。よって、今後、本断層帯の活動時期や活動性に関する確実な資料を得る必要がある。
- 注13: 十日町断層帯(東部)では、約3800-3200年前に活動した可能性があるが、これを最新活動と限定できなかったことから、不明としている。そのため、地震後経過率を求められない。
- 注14: 高田平野断層帯(高田平野東縁断層帯)の最新活動時期は、約3500年前以後、19世紀以前と推定されている。19世紀以前であることは、1847年の地震以降に本断層帯付近で大きな被害地震が起こっていないことに基づいていることから、最新活動時期を3500年前以後、西暦1847年以前として地震発生確率を算出している。
- 注15: 六日町断層帯(北部)については、平成16年(2004年)新潟県中越地震を最新活動としない場合(ケース1)とこれを最新活動とする場合(ケース2)の2つの場合分けをして、評価を行った。ケース1では、最新活動時期が約4900年前-16世紀と十分に絞り込めていない。このため、1つ前の活動(約8000-6400年前)以降に1回の活動があったとして、活動間隔の下限(3200年)を求めた。地震発生確率の計算に際しては、通常のBPT分布を用いることができるだけの信頼度がないと考えて、ポアソン過程を用いた。同じ理由から、地震後経過率も求めている。
- 注16: 長野盆地西縁断層帯については、これまで飯山-千曲区間を単一の活動区間として評価を行っていた(地震調査研究推進本部地震調査委員会, 2001)。その後、同断層帯延長部の分布に関する新たな知見に基づき、飯山-千曲区間の南方延長に麻績区間を新たに追加して評価を行った(地震調査研究推進本部地震調査委員会, 2015)。従来の名称「信濃川断層帯(長野盆地西縁断層帯)」(地震調査研究推進本部地震調査委員会, 2001)は、評価の結果、「長野盆地西縁断層帯(信濃川断層帯)」(地震調査研究推進本部地震調査委員会, 2015)と称することとしたので、ここでは長野盆地西縁断層帯と記述した。
地震調査研究推進本部地震調査委員会(2001): 「信濃川断層帯(長野盆地西縁断層帯)の評価」, 22p.
地震調査研究推進本部地震調査委員会(2015): 「長野盆地西縁断層帯(信濃川断層帯)の長期評価(一部改訂)」, 34p.
- 注17: 邑沼断層帯は、最新活動時期が十分に絞り込まれておらず、通常的手法では平均活動間隔を求めることができない。そこで、過去の活動時期から、約4900年前-9世紀に3回の活動があったとして平均活動間隔を求めている。また、地震発生確率の計算に際しては、通常のBPT分布を用いることができるだけの信頼度がないと考えて、ポアソン過程で求めた。同じ理由から、地震後経過率も求められない。
- 注18: 福井平野東縁断層帯(西部)は、平均活動間隔が不明のため、地震発生確率は求めることができないが、最新活動時期が1948年であり、地震後経過年数が短いため、近い将来の地震発生確率はごく小さいと考えられる。
- 注19: 三方・花折断層帯(花折断層帯/北部)は、平均活動間隔が不明のため、地震発生確率は求めることができないが、最新活動時期が1662年の地震である可能性があることから、近い将来の地震発生可能性は小さいと考えられる。
- 注20: 曾根丘陵断層帯は、最新活動時期が約10000年前以後と求められているが、平均活動間隔2000-3000年に対して十分に絞り込まれていない。このため、地震発生確率の計算に際しては、ポアソン過程を用いた。同じ理由から、地震後経過率も求めてない。
- 注21: 糸魚川-静岡構造線断層帯については、これまで北部・中部・南部に3区分して評価を行っていた(地震調査研究推進本部地震調査委員会, 1996)。地震調査研究推進本部地震調査委員会(2015)は、その後に得られた新たな知見に基づき、北部・中北部・中南部・南部の4つの区間に再区分して評価を行った。
地震調査研究推進本部地震調査委員会(1996): 「糸魚川-静岡構造線活断層系の調査結果と評価」, 10p.
地震調査研究推進本部地震調査委員会(2015): 「糸魚川-静岡構造線断層帯の長期評価(第二版)」, 60p.
- 注22: 境峠・神谷断層帯(主部)は、最新活動時期を約4千9百年前以後-約2千5百年前以前、1つ前の活動を約7千7百年前以後-約6千7百年前以前の可能性があるとし、これら過去2回の活動の間隔を基に平均活動間隔(約1千8百-5千2百年)を求めている。ただし、最新活動時期の年代幅が大きく、またそのため、平均活動間隔に関しても十分に時期を絞り込むことができなかった。したがって、これらの値から算出した地震後経過率(0.5-2.7)及び将来の地震発生確率(今後30年: 0.02%-13%)は、いずれも大きく幅を持たせた評価となっていることに留意する必要がある。
- 注23: 伊那谷断層帯(主部)の最新活動時期は、14世紀以後、18世紀以前と推定されている。18世紀以前であることは、1725年の高遠の地震以降に本断層帯付近で大きな被害地震が起こっていないことに基づいていることから、最新活動時期を西暦1300年以後、西暦1725年以前として地震発生確率を算出している。

注24： 富士川河口断層帯については、駿河トラフで発生した海溝型地震に伴って活動してきたと考えられる。そのため、他の活断層の評価と一概に比較できないことから、別途、参考として記載した。富士川河口断層帯については、その過去の活動時期などについて、2つの可能性が考えられることから、2つのケースに分けて評価している。ケースaの場合、富士川河口断層帯は駿河トラフで発生する海溝型地震と連動して同時に活動し、活動の際には浮島ヶ原地区で沈水現象が生じると考えられる、と評価した。また、ケースbの場合、浮島ヶ原地区で認められた沈水現象については、富士川河口断層帯の活動を伴わない海溝型地震の履歴を表している可能性があり、富士川河口断層帯の過去の活動時期は、断層近傍の地表で変位が生じた時期に基づいて推定するべきであるとして評価した。いずれのケースであっても、発生する地震の規模は、駿河トラフで発生する海溝型地震と連動して同時に活動する場合の規模を推定している。なお、富士川河口断層帯の陸上部で認められている断層が単独で活動する可能性もあり、その場合、マグニチュード7.2程度の地震が発生する可能性がある。

また、将来確率について、ケースaの場合、最新活動時期からの経過時間が平均活動間隔の2倍を超えているため、通常の活断層評価で用いている計算方法（地震の発生確率が時間とともに変動するモデル：BPT分布モデル）ではなく、地震発生確率が時間的に不変とした考え方（ポアソン過程）により長期確率を求めている。なお、活断層の相対的評価については、他の活断層帯と比較した際に今回評価した地震発生確率をそのまま当てはめた場合にはどうなるかを参考までに示したということに留意されたい。

注25： 深谷断層帯・綾瀬川断層については、これまで関東平野北西縁断層帯として平井一櫛挽断層帯・主部の2区分、また、元荒川断層帯として北部・南部に2区分して評価を行っていた（地震調査研究推進本部地震調査委員会、2000、地震調査研究推進本部地震調査委員会、2005）。地震調査研究推進本部地震調査委員会（2015）は、その後に得られた新たな知見に基づき、関東平野北西縁断層帯の平井一櫛挽断層帯から主部の一部までを深谷断層帯、また、元荒川断層帯の北部（関東平野北西縁断層帯の一部）を綾瀬川断層の鴻巣-伊奈区間、元荒川断層帯の南部を伊奈-川口区間として評価を行った。綾瀬川断層南部（伊奈-川口区間）は、元荒川断層帯の南部に対応しこれまで活断層ではないとされていた（地震調査研究推進本部地震調査委員会、2000）が、新たな知見により活断層の可能性を認定した（地震調査研究推進本部地震調査委員会、2015）。

地震調査研究推進本部地震調査委員会（2000）：「元荒川断層帯の評価」、15p.

地震調査研究推進本部地震調査委員会（2005）：「関東平野北西縁断層帯の長期評価」、34p.

地震調査研究推進本部地震調査委員会（2015）：「深谷断層帯・綾瀬川断層（関東平野北西縁断層帯・元荒川断層帯）の長期評価（一部改訂）」、56p.

注26： 塩沢断層帯・平山-松田北断層帯・国府津-松田断層帯については、これまで神縄・国府津-松田断層帯として国府津-松田断層帯から塩沢断層までを一連の断層帯として評価を行っていた（地震調査研究推進本部地震調査委員会、2009）。その後、国府津-松田断層帯については、プレート境界からの分岐断層と判断し、相模トラフ沿いのM8クラスの地震の何回かに一回の割合で同時に動くとして評価した（地震調査研究推進本部地震調査委員会、2014）。また、地震調査研究推進本部地震調査委員会（2015）は、断層帯を構成する断層やそれらの位置・形状、周辺の地下構造、活動履歴に関する新たな知見に基づき、神縄断層を活断層ではないと判断し、塩沢断層帯を伏在断層として南西方向へ延長する等の評価を行った。

地震調査研究推進本部地震調査委員会（2009）：「神縄・国府津-松田断層帯の評価（一部改訂）」、35p.

地震調査研究推進本部地震調査委員会（2014）：「相模トラフ沿いの地震活動の長期評価（第二版）について」、81p.

地震調査研究推進本部地震調査委員会（2015）：「塩沢断層帯・平山-松田北断層帯・国府津-松田断層帯（神縄・国府津-松田断層帯）の長期評価（第二版）」、55p.

■近畿地方

都道府県	断層帯名 (起震断層/活動区間)	よみかた	長期評価で 予想した 地震規模 (マグニチュード)	我が国の主な 活断層における 相対的評価 ^(注4)		地震発生確率 ^(注1)			地震後 経過率 ^(注2)	平均活動間隔
				ランク	色	30年以内	50年以内	100年以内		最新活動時期
滋賀県	柳ヶ瀬・関ヶ原断層帯 (主部/北部)	やながせ・せきがはらだんそうたい	7.6程度	Zランク		ほぼ0%	ほぼ0%	ほぼ0%	0.1-0.2	約2,300-2,700年 17世紀頃
	柳ヶ瀬・関ヶ原断層帯 (主部/中部)		6.6程度	Xランク		不明 ^(注3)	不明 ^(注3)	不明 ^(注3)	不明 ^(注3)	不明 約7,200年前以後、約7,000年前以前
	柳ヶ瀬・関ヶ原断層帯 (主部/南部)		7.6程度	Xランク		不明 ^(注3)	不明 ^(注3)	不明 ^(注3)	不明 ^(注3)	不明 約4,900年前以後、15世紀以前
	柳ヶ瀬・関ヶ原断層帯 (浦底-柳ヶ瀬山断層帯)		7.2程度	Xランク		不明 ^(注3)	不明 ^(注3)	不明 ^(注3)	不明 ^(注3)	不明 不明
	野坂・集福寺断層帯 (野坂断層帯)	のさか・しゅうふくじだんそうたい	7.3程度	Zランク		ほぼ0% もしくはそれ以上	ほぼ0% もしくはそれ以上	ほぼ0% もしくはそれ以上	0.04-0.1 もしくはそれ以上	約5,600-7,600年 ^{もしくはそれ以下} 15-17世紀
	野坂・集福寺断層帯 (集福寺断層帯)		6.5程度	Xランク		不明 ^(注3)	不明 ^(注3)	不明 ^(注3)	不明 ^(注3)	不明 不明
	湖北山地断層帯 (北西部)	こほくさんちだんそうたい	7.2程度	Zランク		ほぼ0%	ほぼ0%	ほぼ0%~ 0.001%	0.2-0.3	約3,000-4,000年 11-14世紀
	湖北山地断層帯 (南東部)		6.8程度	Zランク		ほぼ0%	ほぼ0%	ほぼ0%	0.05-0.09	概ね7,000年程度 15-17世紀
	琵琶湖西岸断層帯 (北部) ^(注27)	びわこせいがんだんそうたい	7.1程度	Sランク		1%~3%	2%~5%	4%~10%	-	約1,000-2,800年 約2,800年前以後、約2,400年前以前
	琵琶湖西岸断層帯 (南部)		7.5程度	Zランク		ほぼ0%	ほぼ0%	ほぼ0%	0.1-0.2	約4,500-6,000年 1185年の地震
	鈴鹿西縁断層帯 ^(注5)	すずかせいえんだんそうたい	7.6程度	Aランク		0.08%~0.2%	0.1%~0.3%	0.3%~0.6%	不明	約18,000-36,000年 不明
	頓宮断層	とんぐうだんそう	7.3程度	A*ランク		1%以下	2%以下	4%以下	1.0以下	約10,000年以上 約10,000年前以後、7世紀以前
	三方・花折断層帯 (三方断層帯)	みかた・はなおれだんそうたい	7.2程度	Zランク		ほぼ0%	ほぼ0%	ほぼ0%	0.06-0.1	約3,800年-約6,300年 1662年の地震
	三方・花折断層帯 (花折断層帯/北部) ^(注19)		7.2程度	Xランク		不明 ^(注3)	不明 ^(注3)	不明 ^(注3)	不明 ^(注3)	不明 1662年の地震
	三方・花折断層帯 (花折断層帯/中南部)		7.3程度	A*ランク		ほぼ0%~0.6%	ほぼ0%~1%	ほぼ0%~2%	0.2-0.7	約4,200-6,500年 約2,800年前以後、6世紀以前
	京都府	木津川断層帯	きづがわだんそうたい	7.3程度	Zランク		ほぼ0%	ほぼ0%	ほぼ0%	0.007-0.04
三方・花折断層帯 (三方断層帯)		みかた・はなおれだんそうたい	7.2程度	Zランク		ほぼ0%	ほぼ0%	ほぼ0%	0.06-0.1	約3,800年-約6,300年 1662年の地震
三方・花折断層帯 (花折断層帯/北部) ^(注19)			7.2程度	Xランク		不明 ^(注3)	不明 ^(注3)	不明 ^(注3)	不明 ^(注3)	不明 1662年の地震
三方・花折断層帯 (花折断層帯/中南部)			7.3程度	A*ランク		ほぼ0%~0.6%	ほぼ0%~1%	ほぼ0%~2%	0.2-0.7	約4,200-6,500年 約2,800年前以後、6世紀以前
山田断層帯 (主部)		やまだだんそうたい	7.4程度	Xランク		不明 ^(注3)	不明 ^(注3)	不明 ^(注3)	不明 ^(注3)	不明 3,300年前以前
山田断層帯 (郷村断層帯)			7.4程度 もしくはそれ以上	Zランク		ほぼ0%	ほぼ0%	ほぼ0%	0.007-0.01	10,000-15,000年程度 1927年北丹後地震
奈良盆地東縁断層帯 ^(注28)		ならぼんちとうえんだんそうたい	7.4程度	S*ランク		ほぼ0%~5%	ほぼ0%~7%	ほぼ0%~10%	0.2-2.2	約5,000年 約11,000年前以後、約1,200年前以前
三峠・京都西山断層帯 (上林川断層)		みとけ・きょうとにしやまだんそうたい	7.2程度	Xランク		不明 ^(注3)	不明 ^(注3)	不明 ^(注3)	不明 ^(注3)	不明 不明
三峠・京都西山断層帯 (三峠断層) ^(注5)			7.2程度	Aランク		0.4%~0.6%	0.7%~1%	1%~2%	不明	5,000-7,000年程度 3世紀以前
三峠・京都西山断層帯 (京都西山断層帯)			7.5程度	A*ランク		ほぼ0%~0.8%	ほぼ0%~1%	ほぼ0%~3%	0.3-0.7	約3,500-5,600年 約2,400年前以後、2世紀以前
有馬-高槻断層帯	ありま-たかつきだんそうたい	7.5程度 (7.5±0.5)	Zランク		ほぼ0%~ 0.04%	ほぼ0%~0.1%	ほぼ0%~0.4%	0.2-0.4	1,000-2,000年程度 1596年慶長伏見地震	

大阪府	有馬－高槻断層帯	ありま－たかつきだんそうたい	7.5程度 (7.5±0.5)	Zランク		ほぼ0%～0.04%	ほぼ0%～0.1%	ほぼ0%～0.4%	0.2-0.4	1,000-2,000年程度 1596年慶長伏見地震
	生駒断層帯	いこまだんそうたい	7.0-7.5程度	Aランク		ほぼ0%～0.2%	ほぼ0%～0.3%	ほぼ0%～0.6%	0.2-0.5	3,000-6,000年 西暦400年頃以後、1,000年頃以前
	三峠・京都西山断層帯 (上林川断層)		7.2程度	Xランク		不明 ^(注3)	不明 ^(注3)	不明 ^(注3)	不明 ^(注3)	不明 不明
	三峠・京都西山断層帯 (三峠断層) ^(注5)	みとけ・きょうとにしやまだんそうたい	7.2程度	Aランク		0.4%～0.6%	0.7%～1%	1%～2%	不明	5,000-7,000年程度 3世紀以前
	三峠・京都西山断層帯 (京都西山断層帯)		7.5程度	A*ランク		ほぼ0%～0.8%	ほぼ0%～1%	ほぼ0%～3%	0.3-0.7	約3,500-5,600年 約2,400年前以後、2世紀以前
	六甲・淡路島断層帯 (主部/六甲山地南縁-淡路島東岸区間)		7.9程度	Aランク		ほぼ0%～1%	ほぼ0%～2%	ほぼ0%～6%	0.2-0.6	900-2,800年程度 16世紀
	六甲・淡路島断層帯 (主部/淡路島西岸区間)	ろっこう・あわじしまだんそうたい	7.1程度	Zランク		ほぼ0%	ほぼ0%	ほぼ0%	0.01-0.02	1,800-2,500年程度 1995年兵庫県南部地震
	六甲・淡路島断層帯 (先山断層帯)		6.6程度	Zランク		ほぼ0%	ほぼ0%	ほぼ0%	0.04-0.2	5,000-10,000年程度 11世紀以後、17世紀初頭以前
	上町断層帯	うえまちだんそうたい	7.5程度	S*ランク		2%～3%	3%～5%	6%～10%	1.1-2より大	8,000年程度 約28,000年前以後、約9,000年前以前
	大阪湾断層帯	おおさかわんだんそうたい	7.5程度	Zランク		0.005%以下	0.009%以下	0.02%以下	0.4以下	約3,000-7,000年 9世紀以後
兵庫県	山田断層帯 (主部)	やまだだんそうたい	7.4程度	Xランク		不明 ^(注3)	不明 ^(注3)	不明 ^(注3)	不明 ^(注3)	不明 3,300年前以前
	山田断層帯 (郷村断層帯)		7.4程度 もしくはそれ以上	Zランク		ほぼ0%	ほぼ0%	ほぼ0%	0.006-0.01	10,000-15,000年程度 1927年北丹後地震
	有馬－高槻断層帯	ありま－たかつきだんそうたい	7.5程度 (7.5±0.5)	Zランク		ほぼ0%～0.04%	ほぼ0%～0.1%	ほぼ0%～0.4%	0.2-0.4	1,000-2,000年程度 1596年慶長伏見地震
	六甲・淡路島断層帯 (主部/六甲山地南縁-淡路島東岸区間)		7.9程度	Aランク		ほぼ0%～1%	ほぼ0%～2%	ほぼ0%～6%	0.2-0.6	900-2,800年程度 16世紀
	六甲・淡路島断層帯 (主部/淡路島西岸区間)	ろっこう・あわじしまだんそうたい	7.1程度	Zランク		ほぼ0%	ほぼ0%	ほぼ0%	0.01-0.02	1,800-2,500年程度 1995年兵庫県南部地震
	六甲・淡路島断層帯 (先山断層帯)		6.6程度	Zランク		ほぼ0%	ほぼ0%	ほぼ0%	0.04-0.2	5,000-10,000年程度 11世紀以後、17世紀初頭以前
	中央構造線断層帯 ^(注29) (金剛山地東縁区間)		6.8程度	Zランク		ほぼ0%	ほぼ0%	ほぼ0%	0.2-0.3	約6,000-7,600年 1世紀以後、3世紀以前
	中央構造線断層帯 ^(注29) (五条谷区間)		7.3程度	Xランク		不明 ^(注3)	不明 ^(注3)	不明 ^(注3)	不明 ^(注3)	不明 約2,200年前以後、7世紀以前
	中央構造線断層帯 ^(注29) (根来区間)		7.2程度	Aランク		0.008%～0.3%	0.02%～0.5%	0.04%～1%	0.4-0.6	約2,500-2,900年 7世紀以後、8世紀以前
	中央構造線断層帯 ^(注29) (紀淡海峡-鳴門海峡区間)		7.5程度	A*ランク		0.005%～1%	0.009%～2%	0.02%～4%	0.4-0.8	約4,000-6,000年 約3,100年前以後、約2,600年前以前
	中央構造線断層帯 ^(注29) (讃岐山脈南縁東部区間)	ちゅうおうこうぞうせんだんそうたい	7.7程度	Aランク		1%以下	2%以下	6%以下	0.6以下	約900-1,200年 16世紀以後
	中央構造線断層帯 ^(注29) (讃岐山脈南縁西部区間)		8.0程度 もしくはそれ以上	Aランク		ほぼ0%～0.4%	ほぼ0%～0.9%	ほぼ0%～3%	0.2-0.5	約1,000-1,500年 16世紀以後、17世紀以前
	中央構造線断層帯 ^(注29) (石鎚山脈北縁区間)		7.3程度	Zランク		0.02%以下	0.03%以下	0.1%以下	0.4以下	約1,500-1,800年 15世紀以後
	中央構造線断層帯 ^(注29) (石鎚山脈北縁西部区間)		7.5程度	S*ランク		ほぼ0%～12%	ほぼ0%～20%	ほぼ0%～40%	0.2-0.9	約700-1,300年 15世紀以後、18世紀以前
	中央構造線断層帯 ^(注29) (伊予灘区間)		8.0程度 もしくはそれ以上	Zランク		ほぼ0%	ほぼ0%	ほぼ0%	0.04-0.1	約2,900-3,300年 17世紀以後、19世紀以前
	中央構造線断層帯 ^(注29) (豊予海峡-由布院区間)		7.8程度	Zランク		ほぼ0%	ほぼ0%	ほぼ0%	0.2-0.3	約1,600-1,700年 17世紀頃
	山崎断層帯 (那岐山断層帯) ^(注5)	やまさきだんそうたい	7.3程度	Aランク		0.06%～0.1%	0.09%～0.2%	0.2%～0.4%	不明	24,000-53,000年程度 不明
	山崎断層帯 (主部/北西部)		7.7程度	Aランク		0.1%～1%	0.2%～2%	0.5%～4%	0.5-0.6	約1,800-2,300年 868年播磨国地震
	山崎断層帯 (主部/南東部)		7.3程度	Zランク		ほぼ0%～0.01%	0.001%～0.02%	0.003%～0.05%	0.4	3,900年程度 4世紀以後、6世紀以前
	山崎断層帯 (草谷断層)		6.7程度	Zランク		ほぼ0%	ほぼ0%	ほぼ0%	0.1-0.3	6,500年程度 4世紀以後、12世紀以前
大阪湾断層帯	おおさかわんだんそうたい		7.5程度	Zランク		0.005%以下	0.009%以下	0.02%以下	0.4以下	約3,000-7,000年 9世紀以後

奈良県	奈良盆地東縁断層帯 ^(注28)	ならぼんちとう えんだんそうたい	7.4程度	S*ランク	ほぼ0%~5%	ほぼ0%~7%	ほぼ0%~10%	0.2-2.2	約5,000年 約11,000年前以後、約1,200年前以前	
	中央構造線断層帯 (金剛山地東縁区間) ^(注29)	ちゅうおうこうぞう せんだんそう たい	6.8程度	Zランク	ほぼ0%	ほぼ0%	ほぼ0%	0.2-0.3	約6,000-7,600年 1世紀以後、3世紀以前	
	中央構造線断層帯 (五条谷区間) ^(注29)		7.3程度	Xランク	不明 ^(注3)	不明 ^(注3)	不明 ^(注3)	不明 ^(注3)	不明 約2,200年前以後、7世紀以前	
	中央構造線断層帯 (根来区間) ^(注29)		7.2程度	Aランク	0.008%~0.3%	0.01%~0.5%	0.04%~1%	0.4-0.6	約2,500-2,900年 7世紀以後、8世紀以前	
	中央構造線断層帯 (紀淡海峡-鳴門海峡区間) ^(注29)		7.5程度	A*ランク	0.005%~1%	0.009%~2%	0.02%~4%	0.4-0.8	約4,000-6,000年 約3,100年前以後、約2,600年前以前	
	中央構造線断層帯 (讃岐山脈南縁東部区間) ^(注29)		7.7程度	Aランク	1%以下	2%以下	6%以下	0.6以下	約900-1,200年 16世紀以後	
	中央構造線断層帯 (讃岐山脈南縁西部区間) ^(注29)		8.0程度 もしくはそれ以上	Aランク	ほぼ0%~0.4%	ほぼ0%~0.8%	ほぼ0%~3%	0.2-0.5	約1,000-1,500年 16世紀以後、17世紀以前	
	中央構造線断層帯 (石鎚山脈北縁区間) ^(注29)		7.3程度	Zランク	0.01%以下	0.03%以下	0.1%以下	0.4以下	約1,500-1,800年 15世紀以後	
	中央構造線断層帯 (石鎚山脈北縁西部区間) ^(注29)		7.5程度	S*ランク	ほぼ0%~12%	ほぼ0%~20%	ほぼ0%~40%	0.2-0.9	約700-1,300年 15世紀以後、18世紀以前	
	中央構造線断層帯 (伊予灘区間) ^(注29)		8.0程度 もしくはそれ以上	Zランク	ほぼ0%	ほぼ0%	ほぼ0%	0.04-0.1	約2,900-3,300年 17世紀以後、19世紀以前	
	中央構造線断層帯 (豊予海峡-由布院区間) ^(注29)		7.8程度	Zランク	ほぼ0%	ほぼ0%	ほぼ0%	0.2-0.3	約1,600-1,700年 17世紀頃	
	和歌山県		中央構造線断層帯 (金剛山地東縁区間) ^(注29)	ちゅうおうこうぞう せんだんそう たい	6.8程度	Zランク	ほぼ0%	ほぼ0%	ほぼ0%	0.2-0.3
中央構造線断層帯 (五条谷区間) ^(注29)			7.3程度		Xランク	不明 ^(注3)	不明 ^(注3)	不明 ^(注3)	不明 ^(注3)	不明 約2,200年前以後、7世紀以前
中央構造線断層帯 (根来区間) ^(注29)		7.2程度	Aランク		0.008%~0.3%	0.01%~0.5%	0.04%~1%	0.4-0.6	約2,500-2,900年 7世紀以後、8世紀以前	
中央構造線断層帯 (紀淡海峡-鳴門海峡区間) ^(注29)		7.5程度	A*ランク		0.005%~1%	0.009%~2%	0.02%~4%	0.4-0.8	約4,000-6,000年 約3,100年前以後、約2,600年前以前	
中央構造線断層帯 (讃岐山脈南縁東部区間) ^(注29)		7.7程度	Aランク		1%以下	2%以下	6%以下	0.6以下	約900-1,200年 16世紀以後	
中央構造線断層帯 (讃岐山脈南縁西部区間) ^(注29)		8.0程度 もしくはそれ以上	Aランク		ほぼ0%~0.4%	ほぼ0%~0.8%	ほぼ0%~3%	0.2-0.5	約1,000-1,500年 16世紀以後、17世紀以前	
中央構造線断層帯 (石鎚山脈北縁区間) ^(注29)		7.3程度	Zランク		0.01%以下	0.03%以下	0.1%以下	0.4以下	約1,500-1,800年 15世紀以後	
中央構造線断層帯 (石鎚山脈北縁西部区間) ^(注29)		7.5程度	S*ランク		ほぼ0%~12%	ほぼ0%~20%	ほぼ0%~40%	0.2-0.9	約700-1,300年 15世紀以後、18世紀以前	
中央構造線断層帯 (伊予灘区間) ^(注29)		8.0程度 もしくはそれ以上	Zランク		ほぼ0%	ほぼ0%	ほぼ0%	0.04-0.1	約2,900-3,300年 17世紀以後、19世紀以前	
中央構造線断層帯 (豊予海峡-由布院区間) ^(注29)		7.8程度	Zランク		ほぼ0%	ほぼ0%	ほぼ0%	0.2-0.3	約1,600-1,700年 17世紀頃	

注1： 確率値は有効数字1桁で記述している。ただし、30年確率が10%台の場合は2桁で記述する。また「ほぼ0%」とあるのは、 10^{-3} %未満の確率値を表す。

注2： 最新活動（地震発生）時期から評価時点までの経過時間を、平均活動間隔で割った値。最新の地震発生時期から評価時点までの経過時間が、平均活動間隔に達すると1.0となる。

注3： 平均活動間隔が判明していない等の理由より、地震発生確率及び地震後経過率を求めることができない。

注4： 活断層における今後30年以内の地震発生確率が3%以上を「Sランク」、0.1~3%を「Aランク」、0.1%未満を「Zランク」、不明（すぐに地震が起きることが否定できない）を「Xランク」と表記している。地震後経過率（注2）が0.7以上である活断層については、ランクに「*」を付記している。Zランクでも、活断層が存在すること自体、当該地域で大きな地震が発生する可能性を示す。

注5： 最新活動の時期が特定できていないため、通常の活断層評価で用いている計算方法（地震の発生確率が時間とともに変動するモデル：BPT分布モデル）ではなく、地震発生確率が時間的に不変とした考え方（ポアソン過程）により長期確率を求めている。同じ理由から、地震後経過率も求められない。

注19： 三方・花折断層帯（花折断層帯/北部）は、平均活動間隔が不明のため、地震発生確率は求めることができないが、最新活動時期が1662年の地震である可能性があることから、近い将来の地震発生可能性は小さいと考えられる。

注27： 琵琶湖西岸断層帯（北部）は、最新活動時期は約2800年前以後、約2400年前以前と求められているが、平均活動間隔約1000年-2800年と比較して最新活動時期からの経過時間が長くなる可能性が考えられる。そのため、地震発生確率の計算に際しては、ポアソン過程を用いた。同じ理由から、地震後経過率も求めている。なお、通常のBPT分布を用いた場合、30年確率のとり得る範囲は3%-20%、地震後経過率は0.9-2.8となる。また、この評価とは別に、琵琶湖西岸断層帯（北部）の最新活動時期を7世紀中葉以降とする考えもある。この考えに従うと、平均活動間隔が大幅に短くなり、将来の地震発生確率も今後30年以内、50年以内、100年以内の地震発生確率は、それぞれ2%-6%、4%-10%、7%-20%と幅がさらに大きくなり、最大値が大きくなることに注意が必要である。

注28： 京都盆地-奈良盆地断層帯南部は、評価の結果、奈良盆地東縁断層帯と称することとしたので、ここでは奈良盆地東縁断層帯と記述した。

注29： 中央構造線断層帯については、これまで6つの区間に分かれて活動するとして評価を行っていた（地震調査研究推進本部地震調査委員会、2011）。その後、同断層帯及び延長部の分布に関する新たな知見に基づき、これまでの各区間を9つの区間に再整理し、また、西端を九州側へ延長した豊予海峡-由布院区間を追加して、計10の区間の断層帯として評価を行った（地震調査研究推進本部地震調査委員会、2017）。また、これらは1つの断層帯として同時に活動する可能性もある。その場合はマグニチュード8.0程度もしくはそれ以上の地震が発生し、その長期確率は、10の区間が個別に活動する長期確率を超えることはないとして評価されている。

地震調査研究推進本部地震調査委員会（2011）：「中央構造線断層帯の評価（一部改訂）」、88p.

地震調査研究推進本部地震調査委員会（2017）：「中央構造線断層帯の長期評価（第二版）」、162p.

■中国地方

都道府県	断層帯名 (起震断層/活動区間)	よみかた	長期評価で 予想した 地震規模 (マグニチュード)	我が国の主な 活断層における 相対的評価 ^(注4)		地震発生確率 ^(注1)			地震後 経過率 ^(注2)	平均活動間隔
				ランク	色	30年以内	50年以内	100年以内		最新活動時期
鳥取県	鹿野-吉岡断層	しかの-よしお かだんそう	7.2程度	Zランク		ほぼ0%	ほぼ0%	ほぼ0%	0.009 -0.02	4,600年-9,200年程度 1943年鳥取地震
島根県	宍道(鹿島)断層 (ケース1) ^(注44)	しんじ(かしま) だんそう	7.0程度 もしくはそれ以上	Zランク		ほぼ0%~ 0.003%	ほぼ0%~ 0.006%	ほぼ0%~ 0.02%	0.1-0.4	約3,300年-約4,900年 8世紀以後、14世紀以前
	S*ランク				0.9%-6%	2%-10%	3%-20%	0.8-1.8	約3,300年-約4,900年 約5,900年前以後、約3,700年前以前	
	弥栄断層	やさかだんそう	7.7程度	S*ランク		ほぼ0%~6%	ほぼ0%~10%	ほぼ0%~20%	0.02-2より大	約4,000年-13,000年 約11,000年前以後、約300年前以前
	大原湖断層	おおはらこだん そう	7.5程度	Xランク		不明 ^(注3)	不明 ^(注3)	不明 ^(注3)	不明 ^(注3)	不明 不明
岡山県	山崎断層帯 (那岐山断層帯) ^(注5)	やまさきだんそ うたい	7.3程度 7.7程度 7.3程度 6.7程度	Aランク		0.06%~0.1%	0.09%~0.2%	0.2%~0.4%	不明	24,000-53,000年程度 不明
	Aランク				0.1%~1%	0.2%~2%	0.5%~4%	0.5-0.6	約1,800-2,300年 868年播磨国地震	
	Zランク				ほぼ0%~ 0.01%	ほぼ0%~ 0.02%	0.003%~ 0.05%	0.4	3,900年程度 4世紀以後、6世紀以前	
	Zランク				ほぼ0%	ほぼ0%	ほぼ0%	0.1-0.3	6,500年程度 4世紀以後、12世紀以前	
	長者ヶ原-芳井断層	ちようじゃがは ら-よしいだん そう	7.3程度	Xランク		不明 ^(注3)	不明 ^(注3)	不明 ^(注3)	不明 ^(注3)	不明 不明
広島県	長者ヶ原-芳井断層	ちようじゃがは ら-よしいだん そう	7.3程度	Xランク		不明 ^(注3)	不明 ^(注3)	不明 ^(注3)	不明 ^(注3)	不明 不明
	筒賀断層	つつがだんそう	7.8程度	Xランク		不明 ^(注3)	不明 ^(注3)	不明 ^(注3)	不明 ^(注3)	不明 不明
	岩国-五日市断層帯 ^(注30) (己斐断層区間)	いわくに-い つかいちだん そうたい	7.1程度	Xランク		不明 ^(注3)	不明 ^(注3)	不明 ^(注3)	不明 ^(注3)	不明 約23,000年前以前
	岩国-五日市断層帯 ^(注30) (五日市断層区間)		7.2程度	Xランク		不明 ^(注3)	不明 ^(注3)	不明 ^(注3)	不明 ^(注3)	不明 7世紀以後、12世紀以前
	岩国-五日市断層帯 ^(注30) (岩国断層区間)		7.6程度	A*ランク		0.03%~2%	0.05%~3%	0.1%~6%	0.6-1.2	約9,000-18,000年 約10,000-11,000年前
	安芸灘断層帯 ^(注31)	あきなだだんそ うたい	7.2程度	S*ランク		0.1%~10%	0.2%~20%	0.4%~30%	0.6-2.4	2,300-6,400年程度 約5,600年前以後、約3,600年前以前
	広島湾-岩国沖断層帯 ^(注31)	ひろしまわん -いわくににおき だんそうたい	7.5程度	Xランク		不明 ^(注3)	不明 ^(注3)	不明 ^(注3)	不明 ^(注3)	不明 不明
山口県	筒賀断層	つつがだんそう	7.8程度	Xランク		不明 ^(注3)	不明 ^(注3)	不明 ^(注3)	不明 ^(注3)	不明 不明
	地福断層	じふくだんそう	7.2程度	Xランク		不明 ^(注3)	不明 ^(注3)	不明 ^(注3)	不明 ^(注3)	不明 不明
	大原湖断層	おおはらこだん そう	7.5程度	Xランク		不明 ^(注3)	不明 ^(注3)	不明 ^(注3)	不明 ^(注3)	不明 不明
	小郡断層	おごおりだんそ う	7.3程度	Zランク		ほぼ0%	ほぼ0%	ほぼ0%	0.01-0.02	約23,000年-25,000年 約500年前以後、約300年前以前
	岩国-五日市断層帯 ^(注30) (己斐断層区間)	いわくに-い つかいちだん そうたい	7.1程度	Xランク		不明 ^(注3)	不明 ^(注3)	不明 ^(注3)	不明 ^(注3)	不明 約23,000年前以前
	岩国-五日市断層帯 ^(注30) (五日市断層区間)		7.2程度	Xランク		不明 ^(注3)	不明 ^(注3)	不明 ^(注3)	不明 ^(注3)	不明 7世紀以後、12世紀以前
	岩国-五日市断層帯 ^(注30) (岩国断層区間)		7.6程度	A*ランク		0.03%~2%	0.05%~3%	0.1%~6%	0.6-1.2	約9,000-18,000年 約10,000-11,000年前
	菊川断層帯 ^(注32) (北部区間)	きくがわだんそ うたい	7.7程度	Xランク		不明 ^(注3)	不明 ^(注3)	不明 ^(注3)	不明 ^(注3)	不明 約14,000年前以後
	菊川断層帯 ^(注32) (中部区間)		7.6程度	S*ランク		0.1%~4%	0.2%~7%	0.4%~10%	0.6-1.4	約4,100-約5,900年 約5,900年前以後、約3,300年前以前
	菊川断層帯 ^(注32) (南部区間)		6.9程度 もしくはそれ以上	Xランク		不明 ^(注3)	不明 ^(注3)	不明 ^(注3)	不明 ^(注3)	不明 不明
	安芸灘断層帯 ^(注31)	あきなだだんそ うたい	7.2程度	S*ランク		0.1%~10%	0.2%~20%	0.4%~30%	0.6-2.4	2,300-6,400年程度 約5,600年前以後、約3,600年前以前
	広島湾-岩国沖断層帯 ^(注31)	ひろしまわん -いわくににおき だんそうたい	7.5程度	Xランク		不明 ^(注3)	不明 ^(注3)	不明 ^(注3)	不明 ^(注3)	不明 不明
	周防灘断層帯 ^(注33) (周防灘断層帯主部区間)	すおうなだだん そうたい	7.6程度	S*ランク		2%~4%	4%~6%	7%~10%	1.3-1.9	概ね5,800-7,500年 約11,000年前以後、約10,000年前以前
	周防灘断層帯 ^(注33) (秋徳沖断層区間)		7.1程度	Xランク		不明 ^(注3)	不明 ^(注3)	不明 ^(注3)	不明 ^(注3)	不明 不明

- 注1： 確率値は有効数字1桁で記述している。ただし、30年確率が10%台の場合は2桁で記述する。また「ほぼ0%」とあるのは、 10^{-3} %未満の確率値を表す。
- 注2： 最新活動（地震発生）時期から評価時点までの経過時間を、平均活動間隔で割った値。最新の地震発生時期から評価時点までの経過時間が、平均活動間隔に達すると1.0となる。
- 注3： 平均活動間隔が判明していない等の理由より、地震発生確率及び地震後経過率を求めることができない。
- 注4： 活断層における今後30年以内の地震発生確率が3%以上を「Sランク」、0.1~3%を「Aランク」、0.1%未満を「Zランク」、不明（すぐに地震が起きることが否定できない）を「Xランク」と表記している。地震後経過率（注2）が0.7以上である活断層については、ランクに「*」を付記している。Zランクでも、活断層が存在すること自体、当該地域で大きな地震が発生する可能性を示す。
- 注5： 最新活動の時期が特定できていないため、通常の活断層評価で用いている計算方法（地震の発生確率が時間とともに変動するモデル：BPT分布モデル）ではなく、地震発生確率が時間的に不変とした考え方（ポアソン過程）により長期確率を求めている。同じ理由から、地震後経過率も求められない。
- 注30： 岩国-五日市断層帯については、これまで岩国断層帯、五日市断層帯のそれぞれを別の断層帯として評価を行っていた（地震調査研究推進本部地震調査委員会、2004a, 2004b）。その後、岩国断層帯、五日市断層帯のそれぞれの延長部の分布に関する新たな知見に基づき、五日市断層帯についてはその南端を海域へ延長して五日市断層区間とし、また、岩国断層帯についてはその北端を海域へ延長して岩国断層区間とし、さらに、己斐断層区間を追加して評価を行った（地震調査研究推進本部地震調査委員会、2016）。
- 地震調査研究推進本部地震調査委員会（2004a）：「五日市断層帯の評価」、16p。
地震調査研究推進本部地震調査委員会（2004b）：「岩国断層帯の評価」、15p。
地震調査研究推進本部地震調査委員会（2016）：「岩国-五日市断層帯（岩国断層帯・五日市断層帯）の長期評価（一部改訂）」、29p。
- 注31： 安芸灘断層帯、広島湾-岩国沖断層帯については、これまで安芸灘断層群として評価していた（地震調査研究推進本部地震調査委員会、2009）。その後、これまで断層群としていたものを新たな知見により、断層の位置関係や連続性を再整理し、安芸灘断層帯、広島湾-岩国沖断層帯の2つの断層帯に区分して評価を行った（地震調査研究推進本部地震調査委員会、2016）。
- 地震調査研究推進本部地震調査委員会（2009）：「安芸灘断層群の評価」、22p。
地震調査研究推進本部地震調査委員会（2016）：「安芸灘断層帯・広島湾-岩国沖断層帯（安芸灘断層群）の長期評価（一部改訂）」、28p。
- 注32： 菊川断層帯については、これまで中部区間を単一の活動区間として評価を行っていた（地震調査研究推進本部地震調査委員会、2003）。その後、同断層帯延長部の分布に関する新たな知見に基づき、菊川断層帯の北西端を北西の沖合へ延長した北部区間を追加し、また、菊川断層帯の南東端を南東へ延長した南部区間を追加して評価を行った（地震調査研究推進本部地震調査委員会、2016）。
- 地震調査研究推進本部地震調査委員会（2003）：「菊川断層帯の評価」、10p。
地震調査研究推進本部地震調査委員会（2016）：「菊川断層帯の長期評価（一部改訂）」、28p。
- 注33： 周防灘断層帯については、これまで宇部沖断層群として周防灘断層群主部、秋穂沖断層帯、宇部南方沖断層帯に区分して評価していた（地震調査研究推進本部地震調査委員会、2008）。その後、これまで断層群としていたものを陸域の新たな知見や連続性などから整理し、周防灘断層帯主部区間、秋穂沖断層帯区間の2つに区分して評価を行った（地震調査研究推進本部地震調査委員会、2016）。
- 地震調査研究推進本部地震調査委員会（2008）：「宇部沖断層群（周防灘断層群）の評価」、29p。
地震調査研究推進本部地震調査委員会（2016）：「周防灘断層帯（周防灘断層群・宇部沖断層群）の長期評価（一部改訂）」、28p。
- 注44： 宍道（鹿島）断層の最新活動時期については、川部地点のトレンチ調査の結果、奈良時代以後、鎌倉時代以前であり、最新活動が西暦880年の出雲地震に対応する可能性が指摘されている（ケース1）。ただし、より西方に位置する南講武地点や仲田地点では、西暦880年頃を含む年代の地層が確認されているものの、これらの地層には断層変位や変形が認められていない。よって、現状では川部地点のみで検出されている奈良時代以後、鎌倉時代以前の活動が、宍道（鹿島）断層全体で生じる固有規模の地震ではない場合には、最新活動時期は約5千9百年前以後、約3千7百年前以前であった可能性もある（ケース2）。ケース1では、地震後経過率が「0.1-0.4」、今後30年以内の地震発生確率が「ほぼ0%~0.003%」のZランクとなる。

■ 四国地方

都道府県	断層帯名 (起震断層/活動区間)	よみかた	長期評価で 予想した 地震規模 (マグニチュード)	我が国の主な 活断層における 相対的評価 ^(注4)		地震発生確率 ^(注1)			地震後 経過率 ^(注2)	平均活動間隔
				ランク	色	30年以内	50年以内	100年以内		最新活動時期
徳島県	中央構造線断層帯 ^(注29) (金剛山地東縁区間)	ちゅうおうこうぞう せんだんそう たい	6.8程度	Zランク	黄	ほぼ0%	ほぼ0%	ほぼ0%	0.2-0.3	約6,000-7,600年 1世紀以後、3世紀以前
	中央構造線断層帯 ^(注29) (五条谷区間)		7.3程度	Xランク	灰	不明 ^(注3)	不明 ^(注3)	不明 ^(注3)	不明 ^(注3)	不明 約2,200年前以後、7世紀以前
	中央構造線断層帯 ^(注29) (根来区間)		7.2程度	Aランク	黄	0.008%~0.3%	0.01%~0.5%	0.04%~1%	0.4-0.6	約2,500-2,900年 7世紀以後、8世紀以前
	中央構造線断層帯 ^(注29) (紀淡海峡-鳴門海峡区間)		7.5程度	A*ランク	黄	0.005%~1%	0.009%~2%	0.02%~4%	0.4-0.8	約4,000-6,000年 約3,100年前以後、約2,600年前以前
	中央構造線断層帯 ^(注29) (讃岐山脈南縁東部区間)		7.7程度	Aランク	黄	1%以下	2%以下	6%以下	0.6以下	約900-1,200年 16世紀以後
	中央構造線断層帯 ^(注29) (讃岐山脈南縁西部区間)		8.0程度 もしくはそれ以上	Aランク	黄	ほぼ0%~0.4%	ほぼ0%~0.8%	ほぼ0%~3%	0.2-0.5	約1,000-1,500年 16世紀以後、17世紀以前
	中央構造線断層帯 ^(注29) (石鎚山脈北縁区間)		7.3程度	Zランク	黄	0.01%以下	0.03%以下	0.1%以下	0.4以下	約1,500-1,800年 15世紀以後
	中央構造線断層帯 ^(注29) (石鎚山脈北縁西部区間)		7.5程度	S*ランク	赤	ほぼ0%~12%	ほぼ0%~20%	ほぼ0%~40%	0.2-0.9	約700-1,300年 15世紀以後、18世紀以前
	中央構造線断層帯 ^(注29) (伊予灘区間)		8.0程度 もしくはそれ以上	Zランク	黄	ほぼ0%	ほぼ0%	ほぼ0%	0.04-0.1	約2,900-3,300年 17世紀以後、19世紀以前
	中央構造線断層帯 ^(注29) (豊予海峡-由布院区間)		7.8程度	Zランク	黄	ほぼ0%	ほぼ0%	ほぼ0%	0.2-0.3	約1,600-1,700年 17世紀頃
香川県	長尾断層帯	ながおだんそう たい	7.3程度	Zランク	黄	ほぼ0%	ほぼ0%	ほぼ0%	0.01-0.04	概ね30,000年程度 8世紀以後、16世紀以前
愛媛県	中央構造線断層帯 ^(注29) (金剛山地東縁区間)	ちゅうおうこうぞう せんだんそう たい	6.8程度	Zランク	黄	ほぼ0%	ほぼ0%	ほぼ0%	0.2-0.3	約6,000-7,600年 1世紀以後、3世紀以前
	中央構造線断層帯 ^(注29) (五条谷区間)		7.3程度	Xランク	灰	不明 ^(注3)	不明 ^(注3)	不明 ^(注3)	不明 ^(注3)	不明 約2,200年前以後、7世紀以前
	中央構造線断層帯 ^(注29) (根来区間)		7.2程度	Aランク	黄	0.008%~0.3%	0.01%~0.5%	0.04%~1%	0.4-0.6	約2,500-2,900年 7世紀以後、8世紀以前
	中央構造線断層帯 ^(注29) (紀淡海峡-鳴門海峡区間)		7.5程度	A*ランク	黄	0.005%~1%	0.009%~2%	0.02%~4%	0.4-0.8	約4,000-6,000年 約3,100年前以後、約2,600年前以前
	中央構造線断層帯 ^(注29) (讃岐山脈南縁東部区間)		7.7程度	Aランク	黄	1%以下	2%以下	6%以下	0.6以下	約900-1,200年 16世紀以後
	中央構造線断層帯 ^(注29) (讃岐山脈南縁西部区間)		8.0程度 もしくはそれ以上	Aランク	黄	ほぼ0%~0.4%	ほぼ0%~0.8%	ほぼ0%~3%	0.2-0.5	約1,000-1,500年 16世紀以後、17世紀以前
	中央構造線断層帯 ^(注29) (石鎚山脈北縁区間)		7.3程度	Zランク	黄	0.01%以下	0.03%以下	0.1%以下	0.4以下	約1,500-1,800年 15世紀以後
	中央構造線断層帯 ^(注29) (石鎚山脈北縁西部区間)		7.5程度	S*ランク	赤	ほぼ0%~12%	ほぼ0%~20%	ほぼ0%~40%	0.2-0.9	約700-1,300年 15世紀以後、18世紀以前
	中央構造線断層帯 ^(注29) (伊予灘区間)		8.0程度 もしくはそれ以上	Zランク	黄	ほぼ0%	ほぼ0%	ほぼ0%	0.04-0.1	約2,900-3,300年 17世紀以後、19世紀以前
	中央構造線断層帯 ^(注29) (豊予海峡-由布院区間)		7.8程度	Zランク	黄	ほぼ0%	ほぼ0%	ほぼ0%	0.2-0.3	約1,600-1,700年 17世紀頃

注1： 確率値は有効数字1桁で記述している。ただし、30年確率が10%台の場合は2桁で記述する。また「ほぼ0%」とあるのは、 10^{-3} %未満の確率値を表す。

注2： 最新活動（地震発生）時期から評価時点までの経過時間を、平均活動間隔で割った値。最新の地震発生時期から評価時点までの経過時間が、平均活動間隔に達すると1.0となる。

注3： 平均活動間隔が判明していない等の理由より、地震発生確率及び地震後経過率を求めることができない。

注4： 活断層における今後30年以内の地震発生確率が3%以上を「Sランク」、0.1~3%を「Aランク」、0.1%未満を「Zランク」、不明（すぐに地震が起きることが否定できない）を「Xランク」と表記している。地震後経過率（注2）が0.7以上である活断層については、ランクに「*」を付記している。Zランクでも、活断層が存在すること自体、当該地域で大きな地震が発生する可能性を示す。

注29： 中央構造線断層帯については、これまで6つの区間に分かれて活動するとして評価を行っていた（地震調査研究推進本部地震調査委員会、2011）。その後、同断層帯及び延長部の分布に関する新たな知見に基づき、これまでの各区間を9つの区間に再整理し、また、西端を九州側へ延長した豊予海峡-由布院区間を追加して、計10の区間の断層帯として評価を行った（地震調査研究推進本部地震調査委員会、2017）。また、これらは1つの断層帯として同時に活動する可能性もある。その場合はマグニチュード8.0程度もしくはそれ以上の地震が発生し、その長期確率は、10の区間が個別に活動する長期確率を超えることはないとして評価されている。

地震調査研究推進本部地震調査委員会（2011）：「中央構造線断層帯の評価（一部改訂）」、88p.

地震調査研究推進本部地震調査委員会（2017）：「中央構造線断層帯の長期評価（第二版）」、162p.

■九州・沖縄地方

都道府県	断層帯名 (起震断層/活動区間)	よみかた	長期評価で 予想した 地震規模 (マグニチュード)	我が国の主な 活断層における 相対的評価(注4)		地震発生確率(注1)			地震後 経過率 (注2)	平均活動間隔
				ランク	色	30年以内	50年以内	100年以内		最新活動時期
福岡県	福智山断層帯	ふくちやまだん そうたい	7.2程度	S*ランク		ほぼ0%~3%	ほぼ0%~4%	0.001%~8%	0.4-2より大	約9,400-32,000年 約28,000年前以後、約13,000年前以前
	西山断層帯(注34) (大島沖区間)	にしやまだんそ うたい	7.5程度	Xランク		不明(注3)	不明(注3)	不明(注3)	不明(注3)	不明 約20,000年前以後
	西山断層帯(注34) (西山区間)		7.6程度	Xランク		不明(注3)	不明(注3)	不明(注3)	不明(注3)	不明 約13,000年前以後、概ね2,000年前以前
	西山断層帯(注34) (嘉麻峠区間)		7.3程度	Xランク		不明(注3)	不明(注3)	不明(注3)	不明(注3)	不明 不明
	宇美断層		うみだんそう	7.1程度	Zランク		ほぼ0%	ほぼ0%	ほぼ0%	0.2以下
	水縄断層帯	みのうだんそ うたい	7.2程度	Zランク		ほぼ0%	ほぼ0%	ほぼ0%	0.1	14,000年程度 679年筑紫地震
	警固断層帯 (北西部)(注35)	けごだんそ うたい	7.0程度	Xランク		不明(注3)	不明(注3)	不明(注3)	不明(注3)	不明 2005年福岡県西方沖の地震
	警固断層帯 (南東部)		7.2程度	S*ランク		0.3%~6%	0.4%~9%	0.9%~20%	0.6-1.4	約3,100-5,500年 約4,300年前以後、約3,400年前以前
	日向峠-小笠木峠断層帯	ひなたとうげ- おかさぎとうげ だんそうたい	7.2程度	Xランク		不明(注3)	不明(注3)	不明(注3)	不明(注3)	不明 不明
	佐賀県	日向峠-小笠木峠断層帯	ひなたとうげ- おかさぎとうげ だんそうたい	7.2程度	Xランク		不明(注3)	不明(注3)	不明(注3)	不明(注3)
佐賀平野北縁断層帯(注5)		さがへいやほく えんだんそ うたい	7.5程度	Aランク		0.2%~0.5%	0.3%~0.8%	0.5%~2%	不明	6,600-19,000年程度 不明
長崎県	雲仙断層群 (北部)(注36)	うんぜんだんそ うぐん	7.3程度以上	Xランク		不明(注3)	不明(注3)	不明(注3)	不明(注3)	不明 約5,000年前以後
	雲仙断層群 (南東部)(注36)		7.1程度	Xランク		不明(注3)	不明(注3)	不明(注3)	不明(注3)	不明 約7,300年前以後
	雲仙断層群 (南西部/北部)		7.3程度	S*ランク		ほぼ0%~4%	ほぼ0%~7%	ほぼ0%~10%	0.2-1.0	約2,500-4,700年 約2,400年前以後、11世紀以前
	雲仙断層群 (南西部/南部)(注37)		7.1程度	Aランク		0.5%~1%	0.8%~2%	2%~5%	-	約2,100-6,500年 約4,500年前以後、16世紀以前
熊本県	布田川断層帯(注38) (宇土半島北岸区間)	ふたがわだん そうたい	7.2程度以上	Xランク		不明(注3)	不明(注3)	不明(注3)	不明(注3)	不明 不明
	布田川断層帯(注38) (宇土区間)		7.0程度	Xランク		不明(注3)	不明(注3)	不明(注3)	不明(注3)	不明 不明
	布田川断層帯(注38) (布田川区間)		7.0程度	Zランク(注39)		ほぼ0%(注39)	ほぼ0%(注39)	ほぼ0%(注39)	ほぼ0- 0.001(注39)	8,100年-26,000年程度(注40) 平成28年(2016年)熊本地震(注39)
	日奈久断層帯(注38) (八代海区間)	ひなぐだんそ うたい	7.3程度	S*ランク		ほぼ0%~16%	ほぼ0%~30%	ほぼ0%~50%	0.1-1.6	1,100年-6,400年程度 約1,700年前以後、約900年前以前
	日奈久断層帯(注38) (日奈久区間)		7.5程度	S*ランク		ほぼ0%~6%	ほぼ0%~10%	ほぼ0%~20%	0.2-2.3	3,600年-11,000年程度 約8,400年前以後、約2,000年前以前
	日奈久断層帯(注38) (高野-白旗区間)		6.8程度	Xランク		不明(注3)	不明(注3)	不明(注3)	不明(注3)	不明 約1,600年前以後、約1,200年前以前
	緑川断層帯(注5)		みどりかわだん そうたい	7.4程度	Zランク		0.04%~0.09%	0.07%~0.1%	0.1%~0.3%	不明
	出水断層帯	いずみだんそ うたい	7.0程度	A*ランク		ほぼ0%~1%	ほぼ0%~2%	ほぼ0%~4%	0.3-0.9	概ね8,000年 約7,300年前以後、約2,400年前以前
	人吉盆地南縁断層	ひとよしぼんち なんえんだん そう	7.1程度	A*ランク		1%以下	2%以下	4%以下	0.9以下	約8,000年以上 約7,300年前以後、約3,200年前以前
	万年山-崩平山断層帯(注41)	はねやま-くえ のひらやまだ んそうたい	7.3程度	Zランク		0.004%以下	0.008%以下	0.03%以下	0.4以下	約2,100-3,700年 13世紀以後

大分県	中央構造線断層帯 ^(注29) (金剛山地東縁区間)	ちゅうおうこうぞうせんだんそうたい	6.8程度	Zランク	ほぼ0%	ほぼ0%	ほぼ0%	0.2-0.3	約6,000-7,600年 1世紀以後、3世紀以前	
	中央構造線断層帯 ^(注29) (五条谷区間)		7.3程度	Xランク	不明 ^(注3)	不明 ^(注3)	不明 ^(注3)	不明 ^(注3)	不明 約2,200年前以後、7世紀以前	
	中央構造線断層帯 ^(注29) (根来区間)		7.2程度	Aランク	0.008%~0.3%	0.01%~0.5%	0.04%~1%	0.4-0.6	約2,500-2,900年 7世紀以後、8世紀以前	
	中央構造線断層帯 ^(注29) (紀淡海峡-鳴門海峡区間)		7.5程度	A*ランク	0.005%~1%	0.009%~2%	0.02%~4%	0.4-0.8	約4,000-6,000年 約3,100年前以後、約2,600年前以前	
	中央構造線断層帯 ^(注29) (讃岐山脈南縁東部区間)		7.7程度	Aランク	1%以下	2%以下	6%以下	0.6以下	約900-1,200年 16世紀以後	
	中央構造線断層帯 ^(注29) (讃岐山脈南縁西部区間)		8.0程度 もしくはそれ以上	Aランク	ほぼ0%~0.4%	ほぼ0%~0.8%	ほぼ0%~3%	0.2-0.5	約1,000-1,500年 16世紀以後、17世紀以前	
	中央構造線断層帯 ^(注29) (石鎚山脈北縁区間)		7.3程度	Zランク	0.01%以下	0.03%以下	0.1%以下	0.4以下	約1,500-1,800年 15世紀以後	
	中央構造線断層帯 ^(注29) (石鎚山脈北縁西部区間)		7.5程度	S*ランク	ほぼ0%~12%	ほぼ0%~20%	ほぼ0%~40%	0.2-0.9	約700-1,300年 15世紀以後、18世紀以前	
	中央構造線断層帯 ^(注29) (伊予灘区間)		8.0程度 もしくはそれ以上	Zランク	ほぼ0%	ほぼ0%	ほぼ0%	0.04-0.1	約2,900-3,300年 17世紀以後、19世紀以前	
	中央構造線断層帯 ^(注29) (豊予海峡-由布院区間)		7.8程度	Zランク	ほぼ0%	ほぼ0%	ほぼ0%	0.2-0.3	約1,600-1,700年 17世紀頃	
	日出生断層帯 ^(注41)		ひじうだんそうたい	7.5程度	Zランク	ほぼ0%	ほぼ0%	ほぼ0%	0.05-0.4	約20,000-27,000年 約7,300年前以後、6世紀以前
	万年山-崩平山断層帯 ^(注41)		はねやま-くえのひらやまだんそうたい	7.3程度	Zランク	0.004%以下	0.008%以下	0.03%以下	0.4以下	約2,100-3,700年 13世紀以後
	周防灘断層帯 ^(注33) (周防灘断層帯主部区間)		すおうなだだんそうたい	7.6程度	S*ランク	2%~4%	4%~6%	7%~10%	1.3-1.9	概ね5,800-7,500年 約11,000年前以後、約10,000年前以前
周防灘断層帯 ^(注33) (秋穂冲断層区間)	7.1程度	Xランク		不明 ^(注3)	不明 ^(注3)	不明 ^(注3)	不明 ^(注3)	不明 不明		
鹿児島県	出水断層帯	いずみだんそうたい	7.0程度	A*ランク	ほぼ0%~1%	ほぼ0%~2%	ほぼ0%~4%	0.3-0.9	概ね8,000年 約7,300年前以後、約2,400年前以前	
	甕断層帯 (上甕島北東冲区間)	こしきだんそうたい	6.9程度	Xランク	不明	不明	不明	不明	不明 不明	
	甕断層帯 (甕区間) ^(注5)		7.5程度	Aランク	0.3%~1%	0.5%~2%	0.9%~4%	不明	2,400-11,000年程度 不明	
沖縄県	宮古島断層帯 (中部)	みやこじまだんそうたい	7.2程度 もしくはそれ以上	Xランク	不明 ^(注3)	不明 ^(注3)	不明 ^(注3)	不明 ^(注3)	不明 不明	
	宮古島断層帯 (西部)		6.9程度 もしくはそれ以上	Xランク	不明 ^(注3)	不明 ^(注3)	不明 ^(注3)	不明 ^(注3)	不明 不明	

注1： 確率値は有効数字1桁で記述している。ただし、30年確率が10%台の場合は2桁で記述する。また「ほぼ0%」とあるのは、 10^{-3} %未満の確率値を表す。

注2： 最新活動（地震発生）時期から評価時点までの経過時間を、平均活動間隔で割った値。最新の地震発生時期から評価時点までの経過時間が、平均活動間隔に達すると1.0となる。

注3： 平均活動間隔が判明していない等の理由より、地震発生確率及び地震後経過率を求めることができない。

注4： 活断層における今後30年以内の地震発生確率が3%以上を「Sランク」、0.1~3%を「Aランク」、0.1%未満を「Zランク」、不明（すぐに地震が起きることが否定できない）を「Xランク」と表記している。地震後経過率（注2）が0.7以上である活断層については、ランクに「*」を付記している。Zランクでも、活断層が存在すること自体、当該地域で大きな地震が発生する可能性を示す。

注5： 最新活動の時期が特定できていないため、通常の活断層評価で用いている計算方法（地震の発生確率が時間とともに変動するモデル：BPT分布モデル）ではなく、地震発生確率が時間的に不変とした考え方（ポアソン過程）により長期確率を求めている。同じ理由から、地震後経過率も求められない。

注29： 中央構造線断層帯については、これまで6つの区間に分かれて活動するとして評価を行っていた（地震調査研究推進本部地震調査委員会、2011）。その後、同断層帯及び延長部の分布に関する新たな知見に基づき、これまでの各区間を9つの区間に再整理し、また、西端を九州側へ延長した豊予海峡-由布院区間を追加して、計10の区間の断層帯として評価を行った（地震調査研究推進本部地震調査委員会、2017）。また、これらは1つの断層帯として同時に活動する可能性もある。その場合はマグニチュード8.0程度もしくはそれ以上の地震が発生し、その長期確率は、10の区間が個別に活動する長期確率を超えることはないとして評価されている。

地震調査研究推進本部地震調査委員会（2011）：「中央構造線断層帯の評価（一部改訂）」、88p.

地震調査研究推進本部地震調査委員会（2017）：「中央構造線断層帯の長期評価（第二版）」、162p.

注33： 周防灘断層帯については、これまで宇部冲断層群として周防灘断層群主部、秋穂冲断層帯、宇部南方冲断層帯に区分して評価していた（地震調査研究推進本部地震調査委員会、2008）。その後、これまで断層群としていたものを陸域の新たな知見や連続性などから整理し、周防灘断層帯主部区間、秋穂冲断層帯区間の2つに区分して評価を行った（地震調査研究推進本部地震調査委員会、2016）。

地震調査研究推進本部地震調査委員会（2008）：「宇部冲断層群（周防灘断層群）の評価」、29p.

地震調査研究推進本部地震調査委員会（2016）：「周防灘断層帯（周防灘断層群・宇部冲断層群）の長期評価（一部改訂）」、28p.

注34： 西山断層帯については、これまで単一の活動区間として評価を行っていた（地震調査研究推進本部地震調査委員会、2004）。その後、同断層帯延長部の分布及び活動履歴に関する新たな知見に基づき、大島冲区間・西山区間・嘉麻峠区間の3区間に区分して評価を行った（地震調査研究推進本部地震調査委員会、2013b）。

地震調査研究推進本部地震調査委員会（2004）：「西山断層帯の評価」、11p.

地震調査研究推進本部地震調査委員会（2013b）：「西山断層帯の評価（一部改訂）」、32p.

注35： 警固断層帯（北西部）は、平均活動間隔などが不明のため、地震発生確率は求めることができないが、最新活動時期が2005年であり、地震後経過年数が短いため、近い将来の地震発生確率はごく小さいと考えられる。なお、断層面の位置・形状や活動履歴の検討をするための地形学・地質学的な資料が得られていないことから、長期評価は主に地震観測結果などの地球物理学的な資料に基づいて行った。

- 注36：雲仙断層群（北部、南東部）は、平均活動間隔が求められていないため、地震発生確率は不明となっている。しかし、信頼度が低い情報ながら、これらの断層帯における平均変位速度は1 m／千年程度に達する可能性が指摘されている。このため、これらの断層帯においては平均活動間隔が最新活動時期からの経過時間よりも短い可能性もあり得るため、注意が必要である。
- 注37：雲仙断層群（南西部/南部）は、最新活動時期が約4500年前－16世紀と求められているが、平均活動間隔2100－6500年に対して十分に絞り込まれていない。このため、地震発生確率の計算に際しては、ポアソン過程を用いた。同じ理由から、地震後経過率も求めてない。
- 注38：布田川断層帯及び日奈久断層帯については、これまで布田川・日奈久断層帯として、北東部・中部・南部に3区分して評価を行っていた（地震調査研究推進本部地震調査委員会，2002）。地震調査研究推進本部地震調査委員会（2013a）は、その後に得られた新たな知見に基づき、布田川断層帯と日奈久断層帯に二分し、さらに布田川断層帯を布田川区間・宇土区間・宇土半島北岸区間、日奈久断層帯を高野－白旗区間・日奈久区間・八代海区間に区分して評価を行った。
- 地震調査研究推進本部地震調査委員会（2002）：「布田川・日奈久断層帯の評価」，35p.
地震調査研究推進本部地震調査委員会（2013a）：「布田川断層帯・日奈久断層帯の評価（一部改訂）」，66p.
- 注39：布田川断層帯布田川区間については、平成28年（2016年）熊本地震で活動した（地震調査研究推進本部地震調査委員会，2016ab）として評価を行った。
- 地震調査研究推進本部地震調査委員会（2016a）：「平成28年4月16日熊本県熊本地方の地震の評価」（2016年4月16日公表）
地震調査研究推進本部地震調査委員会（2016b）：「平成28年（2016年）熊本地震の評価」（2016年5月13日公表）
- 注40：布田川断層帯布田川区間の平均活動間隔については、暫定的に平成28年（2016年）熊本地震発生前の評価（地震調査研究推進本部地震調査委員会，2015）における値とした。
- 地震調査研究推進本部地震調査委員会（2015）：「布田川断層帯・日奈久断層帯の評価（一部改訂）」，6p.
- 注41：日出生断層帯、万年山－崩平山断層帯は、これまで別府－万年山断層帯の一部として評価していた。その後、中央構造線断層帯の再評価（地震調査研究推進本部地震調査委員会，2017a）により、別府－万年山断層帯の構成断層を見直し、日出生断層帯、万年山－崩平山断層帯としてそれぞれ評価した（地震調査研究推進本部地震調査委員会，2017b, 2017c）。
- 地震調査研究推進本部地震調査委員会（2005）：「別府－万年山断層帯の評価」，73p.
地震調査研究推進本部地震調査委員会（2017a）：「中央構造線断層帯の長期評価（第二版）」，162p.
地震調査研究推進本部地震調査委員会（2017b）：「日出生断層帯の長期評価（第一版）」，25p.
地震調査研究推進本部地震調査委員会（2017c）：「万年山－崩平山断層帯の長期評価（第一版）」，28p.